

**ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
«АКУШЕРСТВО И ГЕНЕКОЛОГИЯ»
Вторая категория**

- 1. Для клинической картины разрыва шейки матки характерно периодически повторяющееся кровотечение из половых путей**
 - a) гипотония матки
 - b) ДВС-синдром
 - c) периодическое усиление кровотечения при хорошо сократившейся матке
 - d) постоянное кровотечение при хорошо сократившейся плотной матке

- 2. Травма мочеточника возможна при операции по поводу**
 - a) шеечной миомы
 - b) при удалении интралигаментарных узлов миомы матки
 - c) при удалении кистомы яичника
 - d) при разрыве матки

- 3. Чревосечение при перфорации матки во время искусственного аборта показано**
 - a) при неполном аборте (вне лечебного учреждения)
 - b) при установлении извлечения через шейку матки петли кишечника или сальника
 - c) при обнаружении перфорации матки после введения кюретки (абортцанга)
 - d) при перфорации матки зондом и отсутствии болевой реакции, кровотечения

- 4. Ранение мочевого пузыря при брюшностеночных операциях возникает чаще всего**
 - a) при вскрытии брюшины
 - b) при отсепаровке мочевого пузыря от шейки матки
 - c) при изменении анатомических соотношений органов малого таза
 - d) при воспалительных изменениях в малом тазу

- 5. Возникновению злокачественных новообразований вульвы у девочек в отличие от взрослых обычно предшествует**
 - a) кондилома
 - b) экзематозные процессы
 - c) лейкоплакия
 - d) эндометриоз

- 6. Наиболее типичной формой гонореи у девочек является**
 - a) хроническая
 - b) торпидная
 - c) рецидивирующая
 - d) острая

- 7. ФСГ стимулирует**
 - a) рост фолликулов в яичнике

- b) продукцию кортикостероидов
- c) продукцию ТТГ в щитовидной железе
- d) все перечисленное

8. Андрогены образуются

- a) в яичнике (интерстициальных клетках, строме, внутренней теке)
- b) в сетчатой зоне коры надпочечников
- c) верно и то, и другое
- d) и то, и другое неверно

9. Первичная альгоменорея обусловлена

- a) инфантилизмом
- b) ретродевиацией матки
- c) высокой продукцией простагландинов
- d) всем перечисленным
- e) ничем из перечисленного

10. Для синдрома склерокистозных яичников характерно

- a) гирсутизм
- b) олигоменорея
- c) бесплодие
- d) двустороннее увеличение яичников

11. При послеродовом мастите чаще бывает поражение

- a) двустороннее
- b) у повторнородящих
- c) ниже-внутреннего квадранта
- d) всего перечисленного
- e) ничего из перечисленного

12. Основные преобладающие клинические формы лактационного мастита в последнее время

- a) инфильтративно-гнойный
- b) абсцедирующий
- c) флегмозный

13. Для диагностики воспалительных образований придатков матки наиболее целесообразно применить

- a) трансабдоминальную эхографию
- b) трансвагинальную эхографию
- c) компьютерную томографию
- d) кульдоскопию

14. При гнойных воспалительных образованиях придатков матки очень часто происходит

- a) микроперфорация образования с последующим развитием перитонита

- b) перфорация образования в смежные тазовые органы
- c) образование межкишечного абсцесса
- d) формирование генитальных свищей

15. Операция стерилизации женщины по методу Кирхофа состоит во всем перечисленное, кроме

- a) лапаротомии
- b) рассечении брюшины над маточной трубой
- c) выделение трубы и резекция ее части между двумя наложенными шелковыми лигатурами
- d) отсечения маточного конца трубы от угла матки с последующим лигированием культей
- e) погружения культей трубы между листками мезосальпинкса

16. При операции по поводу ретенционной кисты яичника больной следует произвести (при наличии технической возможности)

- a) удаление придатков
- b) удаление яичника
- c) пункцию кисты и отсасывание содержимого
- d) резекцию яичника с оставлением неизменной его ткани
- e) ничего из перечисленного

17. Показаниями для диатермокоагуляции и криодеструкции шейки матки являются

- a) железисто-папиллярная псевдоэрозия шейки матки
- b) дисплазия шейки матки
- c) рубцовая деформация шейки матки и эктропион
- d) внутриэпителиальный рак шейки матки

18. Мероприятия, проведение которых является обязательным при подготовке к плановым гинекологическим операциям

- a) мытье больного под душем накануне операции
- b) сбривание волос на лобке
- c) назначение седативных и снотворных препаратов больной на ночь перед операцией
- d) выведение мочи катетером перед отправкой больной в операционную

19. Проведение нижней-срединной лапаротомии предпочтительнее

- a) при повторных чревосечениях с удалением старого продольного расположения рубца
- b) при предполагаемом большом объеме операции
- c) при необходимости тщательной ревизии органов брюшной полости
- d) при молодом возрасте женщины

20. При экстирпации матки без придатков, как правило, пересекаются

- a) круглые связки
- b) маточные концы труб
- c) собственные связки яичников
- d) крестцово-маточные связки

21. Техника операции Мадленера с целью хирургической стерилизации женщины состоит

- a) в лапаротомии
- b) в оттягивании трубы кверху до образования петли
- c) в раздавливании трубы в области петли мощной клеммой
- d) в перевязке шелковой лигатурой в области раздавливания

22. Наиболее часто выделяют две стадии крауроза вульвы

- a) атрофическую
- b) склеротическую
- c) промежуточную

23. Макроскопическими изменениями при краурозе и лейкоплакии вульвы являются все перечисленные, кроме

- a) белых пятен
- b) перламутрового оттенка кожи
- c) телеангиозктазий
- d) очаговой пигментации
- e) атрофии наружных половых органов

24. Основной путь метастазирования при раке эндометрия

- a) гематогенный
- b) лимфогенный
- c) имплантационный

25. Прогноз для жизни при пограничных опухолях яичников

- a) сомнительный
- b) неблагоприятный
- c) плохо изучен
- d) относительно благоприятный

26. Крауроз и лейкоплакия вульвы в современном представлении – это

- a) два самостоятельных заболевания
- b) оба заболевания существуют одновременно
- c) возникают последовательно
- d) оба заболевания переходят в рак

27. Наиболее частая локализация рака вульвы

- a) большие половые губы
- b) малые половые губы
- c) клитор
- d) задняя спайка

28. Патогенетическая терапия гиперпластических процессов эндометрия у женщин в репродуктивном возрасте состоит в применении

- a) эстроген-гестагенных препаратов

- b) гестагенов
- c) андрогенов
- d) тиреоидина

29. Для распознавания опухолей яичника используются следующие диагностические методы

- a) цитологический
- b) эндоскопический
- c) ультразвуковой
- d) гистологический

30. Для перекрута ножки опухоли яичника характерны

- a) сильные боли внизу живота, возникшие после физического напряжения
- b) при бимануальном исследовании в малом тазу определяется неподвижная резко болезненная опухоль
- c) положительные симптомы раздражения брюшины на стороне опухоли

31. У больной с клиническим диагнозом апоплексии яичника показанием к операции является

- a) наличие воспаления придатков в анамнезе
- b) дисфункция яичников в анамнезе
- c) болевой синдром
- d) внутрибрюшное кровотечение

32. В лечении больных, оперированных по поводу перитонита, имеет значение

- a) улучшение реологических свойств крови
- b) коррекция нарушений белкового обмена
- c) антибактериальная терапия
- d) проведение неспецифической иммунной терапии

33. Выраженный болевой симптом наблюдается при всех перечисленных локализациях генитального эндометриоза, кроме

- a) истмико-цервикального отдела матки
- b) яичников
- c) шейки матки
- d) маточных труб
- e) ретроцервикальной области

34. Для внутреннего эндометриоза тела матки наиболее характерны следующие клинические симптомы

- a) бесплодие
- b) мажущие кровянистые выделения до и после менструации
- c) гиперполименорея
- d) вторичная анемия

35. Действие даназола, дановала, даногена у больных эндометриозом

- a) подавляет стероидогенез в гонадах и надпочечниках

- b) снижает пик ЛГ и ФСГ
- c) снижает уровень пролактина
- d) подавляет аутоантитела

36. Повышенная продукция пролактина может быть обусловлена

- a) развитием новообразования
- b) развитием аденомы гипофиза
- c) снижением продукции в гипоталамусе пролактинингибирующего фактора
- d) длительным приемом нейролептиков

37. При бесплодии, обусловленном склерокистозом яичников (СКЯ), и отсутствии у больной признаков генитального инфантилизма показано

- a) назначение эстроген-гестагенных препаратов прерывистым курсом (по 2-3 месяца с интервалами 2 месяца) с расчетом на ребаунд-эффект
- b) в интервале между применением эстроген-гестагенных препаратов назначение препаратов, стимулирующих овуляцию (кломифен, клостилбегит) и витаминов Е и С во II фазу менструального цикла при отсутствии эффекта от предшествующей консервативной терапии
- c) проведение, клиновидной резекции яичников при отсутствии эффекта от предшествующей терапии
- d) удаление надпочечников с последующей заместительной терапией

38. Гиперстимуляция яичников может наблюдаться

- a) при применении кломифена (кломистилбегита)
- b) при применении пергонала
- c) при длительном применении комбинированных эстроген-гестагенных препаратов
- d) при применении радоновых ванн

39. Санитарная норма площади на 1 женскую койку («палата мать и дитя») в родильном доме составляет (квадратный метр)

- a) 10
- b) 3
- c) 12
- d) 8

40. Насильственные разрывы шейки матки образуются во всех перечисленных ситуациях, кроме

- a) наложения акушерских щипцов
- b) поворота плода на ножку
- c) извлечения плода за тазовый конец
- d) плодоразрушающих операции
- e) длительного сдавления шейки матки при узком тазе

41. Симптомами начавшегося разрыва матки являются

- a) произвольная и непродуктивная потужная деятельность при головке, подвижной над входом в малый таз
- b) выраженная болезненность живота вне схваток или потуг
- c) кровянистые выделения из матки

d) примесь крови в моче

42. Клиническая картина при расхождении лонного сочленения характеризуется

- a) болью в области лобка
- b) отечностью тканей и углублением между разошедшимися концами лобковых костей
- c) болью при пальпации лонного сочленения
- d) усилением боли в области симфиза при разведении ног, согнутых в коленях и тазобедренных суставах

43. Профилактика травм уретры, мочевого пузыря во время родов включает

- a) диагностику анатомически узкого таза
- b) своевременную диагностику клинически узкого таза
- c) опорожнение мочевого пузыря
- d) при анатомически или же при функционально узком таза своевременное выявление аномалии родовой деятельности

44. Ювенильные маточные кровотечения чаще всего обусловлены

- a) нарушением ритмической продукции гормонов яичника
- b) органическими заболеваниями половой системы
- c) заболеванием различных систем организма

45. К гиперплазии эндометрия у девушки приводит

- a) персистенция фолликула
- b) атрезия фолликула
- c) и то, и другое
- d) ни то, ни другое

46. Эстрогены обладают следующим действием

- a) способствуют перистальтике матки и маточных труб
- b) усиливают процессы окостенения
- c) стимулируют активность клеточного иммунитета

47. Первичная альгоменорея обусловлена

- a) инфантилизмом
- b) ретродевиацией матки
- c) высокой продукцией простагландинов

48. Объективные данные, имеющие значение в диагностике аменореи

- a) масса тела, рост женщины
- b) развитие половых органов
- c) величина артериального давлений, уровень сахара в крови

49. Отсутствие эффекта от диагностического выскабливания матки у больной с нарушением менструального цикла часто свидетельствует

- a) о наличии внутреннего эндометриоза тела матки
- b) о неполном удалении содержимого полости матки
- c) о наличии хронического (базального) эндометрита

50. Гиперстимуляция яичников на фоне бесконтрольного применения кломифена обычно проявляется

- a) в увеличении яичников в размерах
- b) в болях в нижней части живота
- c) в меноррагии
- d) в явлениях вирилизации

51. При наличии синехий в полости матки у больных с маточной аменореей показано

- a) разрушение синехий при гистероскопии
- b) обработка полости матки раствором спирта
- c) введение в полость матки полихлорвинилового протектора на 3-4 недели
- d) назначение циклической гормонотерапии

52. Объем радикального хирургического вмешательства при раке эндометрия

- a) расширенная экстирпация матки с придатками
- b) экстирпация матки с придатками
- c) экстирпация матки без придатков
- d) надвлагалищная ампутация матки

53. К группе риска по развитию послеродового мастита относится

- a) мастит в анамнезе
- b) мастопатия
- c) наличие послеродового эндометрита

54. В диагностике послеродового мастита, как правило, имеет значение

- a) характерные жалобы больной
- b) данные осмотра и пальпации молочных желез
- c) наличие предрасполагающих факторов к его развитию

55. Возможный исход при инфильтративном лактационном мастите как правило

- a) рассасывание инфильтрата
- b) нагноение инфильтрата
- c) сохранение инфильтрата без динамики в течение 8-10 месяцев
- d) развитие через 4-8 недель опухоли молочной железы

56. Элементы комплексной терапии, проводимой у больных с перитонитом, после операции кесарева сечения

- a) рациональная антибиотикотерапия
- b) нормализация объема циркулирующей жидкости
- c) восстановление перистальтики кишечника
- d) оперативное лечение в объеме надвлагалищной ампутации матки с маточными трубами

57. У больной при лапароскопии по поводу подозрения на апоплексию яичника обнаружено небольшое кровотечение из яичника. Необходимо произвести

- a) лапаротомию и ушивание яичника

- b) диатермокоагуляцию яичника под контролем лапароскопии
- c) лапаротомию и резекцию яичника
- d) лапаротомию и удаление придатков матки на стороне поражения

58. Объем оперативного лечения при пре- и микроинвазивном раке вульвы

- a) простая вульвэктомия
- b) вульвэктомия в сочетании с пахово-бедренной лимфаденэктомией
- c) расширенная вульвэктомия с пахово—подвздошной лимфаденэктомии
- d) вульвэктомия и надвлагалищная ампутация матки без придатков

59. Показанием для проведения манчестерской операции является

- a) полное выпадение матки
- b) опущение стенок влагалища и частичное выпадение матки
- c) слишком емкое влагалище
- d) деформация шейки матки

60. Проведение нижней-срединной лапаротомии предпочтительнее

- a) при повторных чревосечениях
- b) с удалением старого продольного расположения рубца
- c) при предполагаемом большом объеме операции
- d) при необходимости тщательной ревизии органов брюшной полости
- e) при молодом возрасте женщины

61. Преимущества нижнесрединной лапаротомии состоят

- a) в возможности продления разреза кверху (обходя пупок слева)
- b) в технической простоте исполнения
- c) в меньшем риске эвентрации
- d) при воспалительных послеоперационных осложнениях
- e) в возможности раннего вставания больной с постели

62. Зондирование матки, как правило, производится

- a) перед искусственным абортом
- b) перед диагностическим выскабливанием полости матки
- c) перед введением в матку ВМС
- d) при подозрении на наличие подслизистого узла миомы

63. В состав анатомической ножки кисты яичника входит

- a) воронко-тазовая связка
- b) собственная связка яичника
- c) мезовариум
- d) труба

64. Метастазирование рака шейки матки происходит в лимфоузлы

- a) наружные и внутренние подвздошные, запирающие
- b) общие подвздошные
- c) поясничные

d) парааортальные

65. Показанием для расширенной экстирпации матки с придатками является рак шейки матки стадии

- a) 1б (у женщин до 50 лет)
- b) II (при сочетании опухоли с беременностью)
- c) III (метастатический вариант)
- d) 0

66. Выбор лечебной тактики у больной со злокачественной опухолью яичника

- a) определяется стадией заболевания
- b) гистоструктурой опухоли
- c) возрастом больной
- d) состоянием внутренних органов

67. Морфологические изменения при краурозе вульвы характеризуются

- a) дистрофией
- b) отеком и атрофией дермы
- c) фиброзом и склерозом дермы
- d) вторичными изменениями в эпителии

68. Особенностью развития рака вульвы, локализованного в клиторе, является

- a) быстрый рост
- b) кровоточивость тканей
- c) раннее метастазирование
- d) большие размеры опухоли

69. Запущенность рака вульвы, как правило, связана

- a) с поздним обращением больной к врачу
- b) с отсутствием онкологической настороженности врача
- c) с ошибками диагностики
- d) с неоправданной стеснительностью женщины

70. Объем радикального хирургического вмешательства при раке эндометрия

- a) расширенная экстирпация матки с придатками
- b) экстирпация матки с придатками
- c) экстирпация матки без придатков
- d) надвлагалищная ампутация матки

71. Цитологическими признаками малигнизации эпителия шейки матки являются

- a) полиморфизм клеток
- b) изменение соотношения ядра и цитоплазмы в клетке
- c) дискариоз
- d) наличие патологических митозов

72. Сроки временной нетрудоспособности больной, оперированной по поводу внематочной беременности, желательны не менее

- a) 3
- b) 1
- c) 4

73. Трубный аборт (без значительного внутрибрюшного кровотечения) надо дифференцировать

- a) с самопроизвольным выкидышем малого срока
- b) с обострением хронического сальпингоофорита
- c) с дисфункциональным маточным кровотечением

74. Тактика врача при небольшом дефекте матки (во время чревосечения по поводу перфорации матки) включает все перечисленное, кроме

- a) надвлагалищной ампутации матки
- b) иссечения краев перфорационного отверстия
- c) ушивания перфорационного отверстия
- d) ревизии органов малого таза
- e) ревизии кишечника, прилежащего к матке

75. Для улучшения реологических свойств крови у больных, оперированных по поводу гнойного перитонита, применяют

- a) трасилол
- b) гепарин
- c) реополиглюкин

76. При перфорации матки необходимо обязательно произвести лапаротомию, если

- a) перфорация матки произведена зондом
- b) состояние больной удовлетворительное
- c) признаки кровотечения в брюшную полость не выражены
- d) все перечисленное
- e) ничего из перечисленного

77. Для диагностики нагноившегося tuboовариального образования, как правило, применяют

- a) УЗИ
- b) лапароскопию
- c) диагностическую пункцию через задний влагалищный свод
- d) гистеросальпингографию

78. Некроз миоматозного узла наиболее часто происходит

- a) во время беременности
- b) в послеродовом периоде
- c) в послеабортном периоде
- d) за 3-5 дней до начала менструации

79. Возможным исходом внематочной беременности является

- a) донашивание беременности до поздних сроков
- b) обызвествление и мумификация плодного яйца

- c) трубный аборт на ранних сроках с последующей резорбцией плодного яйца
- d) разрыв плодместилища, кровотечение и шок

80. Выраженный болевой симптом наблюдается при всех перечисленных локализациях генитального эндометриоза кроме

- a) истмико-цервикального отдела матки
- b) яичников
- c) шейки матки
- d) маточных труб
- e) ретроцервикальной области

81. Для внутреннего эндометриоза тела матки наиболее характерны следующие клинические симптомы

- a) бесплодие
- b) мажущие кровянистые выделения до и после менструации
- c) гиперполименорея
- d) вторичная анемия

82. При выявлении аденогенитального синдрома (АГС) лечение необходимо начинать

- a) с момента установления диагноза
- b) после установления менструальной функции
- c) после замужества (в зависимости от времени планируемой беременности)
- d) только после родов

83. При бесплодии обусловленном аденогенитальным синдромом у больных с признаками генитального инфантилизма показано

- a) назначение дексаметазона (преднизолона) под контролем 17-кетостероидов в суточном количестве мочи
- b) проведение двухфазной гормональной терапии (эстрогены в I фазу, гестагены во II фазу) прерывистыми циклами, по 2-3 месяца с интервалом в 2 месяца
- c) в интервале между гормональной терапией - назначение препаратов, стимулирующих овуляцию (кломифен, клостилбегит), витаминов Е и С во II фазу менструального цикла
- d) при отсутствии эффекта от предшествующей консервативной терапии проведение клиновидной резекции яичников

84. Для синдрома лютеинизация неовулировавшего фолликула характерно

- a) наличие двухфазной базальной температуры
- b) циклические изменения в эндометрии, не отличающиеся от нормы
- c) бесплодие
- d) монофазная базальная температура (выше 37°C) на протяжении менструального цикла

85. Мероприятие по оказанию первичной помощи пострадавшему, находящемуся в тяжелом состоянии – это

- a) дезактивация кожи
- b) прием радиопротектара
- c) реанимационные мероприятия
- d) гемосорбция

е) купирование рвоты

86. Предпочтительным донором костного мозга для лечения больного острой лучевой болезнью являются

- а) родители больного
- б) родные братья или сестры
- в) дети больного
- г) другие члены семьи

87. Причины разрыва мочевого пузыря в родах

- а) разрыв матки в родах
- б) извлечение крупного плода из полости матки в момент операции кесарева сечения через небольшое отверстие в матке
- в) насильственный разрыв матки при родоразрешающих операциях
- г) все перечисленные
- д) ничего из перечисленного

88. Клинические признаки совершившегося разрыва матки

- а) распирающая боль в животе
- б) тяжелое состояние женщины, связанное с шоком
- в) прекращение родовой деятельности
- г) определение частей плода при пальпации непосредственно под брюшной стенкой

89. Клиническая картина при расхождении лонного сочленения характеризуется

- а) болью в области лобка
- б) отеком тканей и углублением между разошедшимися концами лобковых костей
- в) болью при пальпации лонного сочленения
- г) усилением боли в области симфиза при разведении ног, согнутых в коленях и тазобедренных суставах

90. Терапия изосексуального преждевременного полового созревания у девочек сводится к применению

- а) сигетина (в возрастных дозах)
- б) свежего картофельного сока (по 2 ст. ложки 2 раза в день)
- в) при гормонально-активных опухолях яичников лечение оперативное
- г) всего перечисленного
- д) ничем из перечисленного

91. Особенности терапии ДМК у больных климактерического возраста является

- а) проведение раздельного лечебно—диагностического выскабливания для верификации диагноза
- б) терапия, направленная на подавление функции яичников
- в) лечение сопутствующей соматической патологии
- г) проведение циклической гормональной терапии

92. Высокая продукция простагландинов в молочной железе вызывает

- а) отек

- b) венозный стаз
- c) пролиферацию эпителия
- d) пролиферацию стромы

93. К группе риска по развитию воспалительных послеродовых заболеваний относятся женщины

- a) женщины с отягощенным акушерско—гинекологическим анамнезом
- b) с хроническим воспалительным процессом гениталий
- c) с экстрагенитальными воспалительными заболеваниями (тонзиллит, пиелонефрит)
- d) со всем перечисленным
- e) ни с чем из перечисленного

94. Госпитальная инфекция чаще всего обусловлена

- a) золотистым стафилококком
- b) грамотрицательной флорой
- c) анаэробами
- d) ассоциацией микроорганизмов
- e) ничем из перечисленного

95. Гонорейную этиологию воспалительного процесса в области придатков матки можно предположить (с большой долей вероятности)

- a) при наличии двустороннего сальпингоофорита у первично бесплодной женщины
- b) при сочетании двустороннего сальпингоофорита (у женщин, у которых не было родов, абортов, инвазивных лечебно-диагностических процедур)
- c) при сочетании двустороннего сальпингоофорита с уретритом, бартолинитом

96. Для лечения гарднереллеза целесообразно применение у больных

- a) доксициклина
- b) тинидазола
- c) далацина С

97. К консервативным операциям, производимым на матке, относятся

- a) отсечение подбрюшинного миоматозного узла на ножке
- b) вылушивание миоматозных узлов, расположенных межмышечно
- c) дефундация матки
- d) удаление подслизистого узла миомы под контролем гистероскопии

98. В современных условиях хирургическая стерилизация женщины может производиться

- a) при лапароскопии
- b) при гистероскопии
- c) по методу Кирхофа
- d) по методу Мадленера

99. Гонадотропины, играющие роль в патогенезе гиперпластических процессов и рака эндометрия секретируются

- a) надпочечниками

- b) гипоталамусом
- c) яичниками
- d) передней долей гипофиза

100. Современные исследования позволяют выделить патогенетические типы гиперпластических процессов и рака эндометрия

- a) первый
- b) второй
- c) смешанный
- d) неклассифицируемый

101. Факторы риска передачи ВИЧ-инфекции в родах:

- a) Длительный безводный период
- b) Отсутствие АРВ профилактики в родах
- c) Амниотомия, инвазивный мониторинг плода
- d) Все вышеперечисленное неверно

102. Противоэпидемические мероприятия в палатах для ВИЧ-инфицированных пациенток и их новорожденных детей проводится по типу:

- a) Режима для больных вирусными гепатитами с парентеральным механизмом передачи
- b) Режима для больных с гнойно-септическими инфекциями
- c) Режима для больных с карантинными инфекциями

103. Выберите отличия в обслуживании заведомо ВИЧ-инфицированного пациента от обычного при проведении парентеральной процедуры:

- a) одеть маску, халат, перчатки, очки
- b) одеть двойные латексные перчатки
- c) приготовить емкости с дезраствором
- d) дополнительно проверить как обработаны и заклеены ранки на руках
- e) обработать ногтевые фаланги спиртовым раствором йода
- f) выполнять процедуру в присутствии старшей медсестры или зав.отделением
- g) иметь дублера на случай аварийной ситуации

104. Противоретровирусная терапия включает в себя:

- a) Два препарата ингибиторов обратной транскриптазы и один ингибитор протеазы
- b) Два препарата ингибитора протеазы и один препарат группы ингибиторов обратной транскриптазы

105. Выберите перечень кодов которые используются в настоящее время:

- a) 102,104,103,108,109,113,112,115,118,121,123,127,300,125.
- b) 100,102,104,108,109,112,113,117,115,118,121,123,124,127,200.
- c) 102,104,103,108,109,112,113,115,118,120,200.

106. Какие основные цели современной АРВТ:

- a) Максимальное подавление репликации ВИЧ
- b) Полная элиминация вируса из организма
- c) Сохранение функции иммунной системы

d) Повышение качества жизни

107. Широкое распространение вируса гепатита С у ВИЧ-инфицированных:

- a) С парентеральным употреблением наркотиков
- b) С частыми бактериальными осложнениями
- c) С туберкулезом
- d) С заражением токсоплазмозом
- e) С заражением вирусом герпеса

108. Факторы повышающие риск вертикального пути заражения:

- a) Внутривенное употребление наркотиков беременной
- b) Кесарево сечение
- c) Поздняя стадия заболевания ВИЧ у беременной
- d) Хориоамнионит у беременной

109. Пробы сыворотки, до момента доставки в лабораторию, могут храниться в ЛПУ:

- a) До 1 суток при температуре +4-8*С
- b) В течении 5 суток при температуре +4-8*С
- c) До 7 суток при температуре +4-8*С
- d) Несколько месяцев при температуре +4-8*С

110. Что нужно сделать при аварийной ситуации в родильном зале:

- a) Оказать себе самопомощь, используя аптечку для профилактики ВИЧ-инфекции
- b) Сообщить представителю администрации об аварии
- c) Уточнить данные по ВИЧ-статусу родильницы или обследовать ее на антитела к ВИЧ
- d) Сообщить родственникам родильницы о факте аварии в родзале
- e) Зарегистрировать в журнале регистрации несчастных случаев на производстве факт аварии
- f) Медработнику обследоваться на наличие антител к ВИЧ после аварии методом экспрестестов с последующим обследованием через лабораторию
- g) Обратиться к доверенному врачу по ВИЧ-инфекции с целью коррекции постконтактной терапии
- h) В первые 2 часа начать принимать полноценную схему ВААРТ

111. Кто имеет право подписывать информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство или отказ от медицинского вмешательства?

- a) гражданин, нуждающийся в медицинской помощи
- b) один из родителей
- c) законный представитель гражданина
- d) медицинский работник
- e) все вышеперечисленные

112. Какие виды экспертиз проводятся в соответствии с ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан РФ» от 21.11.2011г. №323-ФЗ?

- a) экспертиза временной нетрудоспособности
- b) экспертиза качества медицинской помощи

- c) военно-врачебная экспертиза
- d) медико-социальная экспертиза
- e) экспертиза профессиональной пригодности
- f) экспертиза связи заболевания с профессией
- g) судебно-медицинская
- h) судебно-психиатрическая экспертиза
- i) все вышеперечисленные

113. На какой срок может выдать листок нетрудоспособности врач единолично?

- a) на срок не более 15 дней
- b) на срок не более 30 дней
- c) на весь срок нетрудоспособности

114. Какие формы контроля качества и безопасности медицинской деятельности определены в ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ от 21.11.2011г. № 323-ФЗ?»

- a) государственный контроль
- b) ведомственный контроль
- c) внутренний контроль
- d) все вышеперечисленные

115. Как часто может гражданин выбирать медицинскую организацию для получения первичной медико-санитарной помощи, в том числе по территориально-участковому принципу?

- a) не чаще чем два раза в год
- b) не чаще чем один раз в год
- c) не чаще одного раза в 2 года

116. Кто имеет право непосредственно знакомиться с медицинской документацией пациента, отражающей состояние его здоровья?

- a) пациент и его законный представитель
- b) родственники
- c) работодатели

117. Каким Приказом в настоящее время утвержден порядок выдачи листков нетрудоспособности?

- a) приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.06.2011г. №624н «Об утверждении порядка выдачи листков нетрудоспособности»
- b) приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.08.2007г. №514 «О порядке выдачи медицинскими организациями листков нетрудоспособности»
- c) приказом ФСС РФ №18, Минздрава РФ №29 от 29.01.2004г. «Об утверждении Инструкции о порядке обеспечения бланками листков нетрудоспособности, их учета и хранения»

118. Каким Приказом в настоящее время утверждена форма бланка листка нетрудоспособности?

- a) приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.06.2011г. №624н «Об утверждении порядка выдачи листков нетрудоспособности»

- b) приказом Минздравсоцразвития от 26.04.2011г. №347н «Об утверждении формы бланка листка нетрудоспособности»
- c) приказом ФСС РФ №18, Минздрава РФ №29 от 29.01.2004г. «Об утверждении Инструкции о порядке обеспечения бланками листков нетрудоспособности, их учета и хранения»

119. Каким приказом утверждена Инструкция о порядке обеспечения бланками листков нетрудоспособности, их учета и хранения?

- a) приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.06.2011г. №624н «Об утверждении порядка выдачи листков нетрудоспособности»
- b) приказом Минздравсоцразвития от 26.04.2011г. №347н «Об утверждении формы бланка листка нетрудоспособности»
- c) приказом ФСС РФ №18, Минздрава РФ №29 от 29.01.2004г. «Об утверждении Инструкции о порядке обеспечения бланками листков нетрудоспособности, их учета и хранения»

120. Укажите основные принципы охраны здоровья граждан в Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

- a) соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий
- b) приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи
- c) приоритет охраны здоровья детей
- d) социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья
- e) ответственность органов государственной власти и органов местного самоуправления, должностных лиц организаций за обеспечение прав граждан в сфере охраны здоровья
- f) доступность и качество медицинской помощи
- g) недопустимость отказа в оказании медицинской помощи
- h) приоритет профилактики в сфере охраны здоровья
- i) соблюдение врачебной тайны
- j) всё вышеперечисленное