

**ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ  
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  
«ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ»**

Вторая категория

- 1. К какому уровню относится профилактика, направленная на устранение факторов риска заболеваний?**
  - a) первичному;
  - b) вторичному;
  - c) третичному.
  
- 2. К какому уровню относится профилактика, направленная на раннее обнаружение и лечение заболеваний при наличии факторов риска?**
  - a) первичному;
  - b) вторичному;
  - c) третичному.
  
- 3. К какому уровню относится профилактика, направленная на уменьшение осложнений и прогрессирование заболевания?**
  - a) первичному;
  - b) вторичному;
  - c) третичному.
  
- 4. К модифицируемым факторам риска относятся все, кроме:**
  - a) генетические особенности, возраст, пол;
  - b) социальные, поведенческие;
  - c) биологические;
  - d) экологические.
  
- 5. К немодифицируемым факторам риска относятся:**
  - a) генетические особенности, возраст, пол;
  - b) социальные, поведенческие;
  - c) биологические;
  - d) экологические.
  
- 6. К поведенческим и социальным факторам риска относятся все, кроме:**
  - a) нерациональное питание;
  - b) курение;
  - c) употребление алкоголя;
  - d) гиперурикемия;
  - e) гиподинамия;
  - f) низкий социальный и образовательный статус.
  
- 7. К биологическим факторам риска относятся все, кроме:**
  - a) артериальная гипертония;
  - b) курение;

- c) гиперурикемия;
- d) дислипидемия;
- e) гиперинсулинемия;
- f) наследственность.

**8. Что включается в определение понятия «здоровье» согласно Уставу ВОЗ?**

- a) состояние, характеризующееся уровнем физического развития, физических возможностей и адаптационных особенностей, обеспечивающее достижение качества жизни;
- b) состояние организма, оптимальное для реализации репродуктивной функции;
- c) состояние полного физического, психологического и социального благополучия, а не только отсутствия болезней или физических дефектов.

**9. Отметьте виды учетной документации по медицинской профилактике в ЛПУ:**

- a) журнал учета санпросвет работы;
- b) журнал учета работы ЛПУ по медицинской профилактике;
- c) утвержденных форм учета профилактической работы нет.

**10. Мероприятия третичной профилактики должны:**

- a) средние медицинские работники прошедшие специальную подготовку;
- b) врачи прошедшие специальную подготовку;
- c) медицинские работники всех специальностей;
- d) врачи-гигиенисты.

**11. Включает ли «третичная профилактика» понятие реабилитация (восстановление здоровья)?**

- a) да
- b) нет

**12. Для чего используется шкала SCORE?**

- a) для оценки стадии сердечной недостаточности;
- b) для оценки суммарного кардиоваскулярного риска;
- c) для определения типа курительного поведения.

**13. Факторами риска развития артериальной гипертензии являются все, кроме:**

- a) наследственность;
- b) курение;
- c) повышенная масса тела;
- d) повышенная инсоляция;
- e) повышенный уровень холестерина.

**14. Как часто медработники первичного звена должны предлагать помощь в отказе от курения курящему пациенту?**

- a) не реже 1 раза в год;
- b) не реже 1 раза в квартал;
- c) при каждой встрече;
- d) не имеют права предлагать помощь, т.к. этим должны заниматься специалисты.

**15. Перечислите, что нужно сделать при аварийной ситуации в случае обслуживания ВИЧ-инфицированного:**

- a) поставить в известность заведующую отделением или вышестоящего по должности мед.работника;
- b) обратиться к доверенному по ВИЧ – инфекции врачу ЛПУ;
- c) выполнить генеральную уборку по эпид.показаниям;
- d) зарегистрировать в журнале аварийную ситуацию;
- e) провести химиопрофилактику полным курсом ВААРТ в течение 1 месяца;
- f) провести химиопрофилактику АЗТ (азидотимидин) в течение 2-х месяцев;
- g) составит акт о несчастном случае на производстве;
- h) оказать себе самопомощь и организовать дезинфекцию;
- i) сообщить о ситуации родственникам больного;
- j) мед.работнику пройти обследование на наличие антител к ВИЧ.

**16. К какой группе вирусов относится ВИЧ?**

- a) семейство ортовирюсов, подсемейство лентивирусов;
- b) семейство ретровирусов, подсемейство лентивирусов;
- c) семейство арбовирусов, подсемейство флаовирусов;
- d) семейство ретровирусов, подсемейство линсивирусов.

**17. Наиболее ранний срок появления антител к ВИЧ после заражения составляет:**

- a) 2 недели;
- b) 1 месяц;
- c) 3 месяца.

**18. Для установления инфицированности ВИЧ у взрослого достаточно:**

- a) обнаружения в крови специфических антител к ВИЧ методом ИБ;
- b) определение уровня СД 4;
- c) наличие персистирующей генерализованной лимфоденопатии;
- d) наличие контакта с ВИЧ – инфицированным;
- e) наличие саркомы Капоши с сочетанием генерализованной лимфоденопатии.

**19. Пробы сыворотки, до момента доставки в лабораторию, могут храниться в ЛПУ:**

- a) до 1 суток при температуре +4 +8 градусов С;
- b) в течение 5 суток при температуре +4 +8градусов С;
- c) до 7 суток при температуре +4 +8 градусов С;
- d) несколько месяцев при температуре +4 +8 градусов С.

**20. Какие методы используются для выявления антител к ВИЧ в исследуемой сыворотке пациента?**

- a) полимеразная цепная реакция (ПЦР);
- b) иммуноферментный анализ (ИФА);
- c) проточная цитометрия.

**21. Ребенок от ВИЧ – инфицированной матери может заразиться:**

- a) внутриутробно;

- b) в родах;
- c) при бытовом уходе за ребенком (пеленание, купание и т.д.);
- d) при грудном вскармливании;
- e) при наличии ВИЧ – инфекции у акушерки.

**22. Назовите отличия в обслуживании заведомо ВИЧ – инфицированного пациента при проведении парентеральной процедуры:**

- a) одеть маску, перчатки, халат, очки;
- b) одеть двойные латексные перчатки;
- c) одеть бахилы, сменную обувь;
- d) приготовить емкости с дез.раствором;
- e) обработать руки для проведения хирургических вмешательств;
- f) обработать фаланги спиртовым раствором йода;
- g) дополнительно обработать и заклеить ранки на руках;
- h) выполнять процедуру в присутствии старшей сестры или заведующей отделением;
- i) иметь дублера на случай аварийной ситуации.

**23. Действия медработника в случае попадания крови на слизистую носа:**

- a) промыть 50% раствором марганцевого кислого калия;
- b) закапать 96% спирт;
- c) промыть слизистую большим количеством воды.

**24. К какой группе вирусов относится ВИЧ:**

- a) семейство ортовирюсов, подсемейство лентовирусов;
- b) семейство ретровирусов, подсемейство лентивирусов;
- c) семейство арбовирусов, подсемейство флаовирусов.