

**ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ  
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  
«ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО (ФЕЛЬДШЕРЫ ШКОЛ)»  
Первая категория**

**1. Стерилизация - это:**

- a) предупреждение попадания микроорганизмов в рану
- b) уничтожение вегетативных форм микроорганизмов
- c) уничтожение микроорганизмов всех видов на всех стадиях развития
- d) процесс освобождения продукта от всех форм жизнеспособных микроорганизмов

**2. Пути передачи инфекции, связанной с оказанием медицинской помощи:**

- a) трансмиссивный
- b) контактный
- c) аспирационный
- d) химический

**3. Основные методы деkontаминации рук медицинского персонала:**

- a) социальный
- b) профилактический
- c) гигиеническая обработка рук
- d) обработка рук хирурга

**4. Возможные пути передачи ВИЧ-инфекции:**

- a) пользование общей посудой
- b) укусы насекомых
- c) переливание донорской крови

**5. Пути передачи ВИЧ-инфекции:**

- a) половой
- b) парентеральный
- c) вертикальный
- d) энтеральный
- e) все ответы верны

**6. Есть ли риск заражения ВИЧ-инфекцией при попадании биологической инфицированной жидкости на кожу:**

- a) нет
- b) есть, в случае повреждения кожи

**7. Заражение медработника реально в случае:**

- a) при проведении инъекции - прокол
- b) во время операции - порез руки, попадание крови на слизистые
- c) при физикальном осмотре

**8. При каких процедурах возможно заражение пациента гепатитом В, С, ВИЧ-инфекцией:**

- a) переливание крови и ее компонентов
- b) трансплантация органов и тканей
- c) введение подключичного катетера
- d) все ответы верны

**9. Гигиеническая деkontаминация рук показана:**

- a) после контакта с биологическими жидкостями
- b) перед инвазивными процедурами и после них
- c) перед и после ухода за раной
- d) до и после снятия перчаток
- e) все ответы верны

**10. ВИЧ-инфекция – болезнь, характеризующаяся следующими признаками.**

- a) необычно продолжительный (до 5-7 лет) скрытый период заболевания
- b) пожизненное носительство вируса
- c) постоянная репликация вируса в организме
- d) смертельный исход заболевания
- e) поражение иммунной системы
- f) все ответы верны

**11. Информированное согласие должно быть получено:**

- a) устно
- b) письменно
- c) в присутствии нотариуса
- d) в присутствии родственников

**12. Врачебную тайну составляют:**

- a) сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при его медицинском обследовании и лечении
- b) особенности взаимодействия врача и пациента
- c) конфликты между врачом и медицинской сестрой

**13. Этика - это наука о:**

- a) морали
- b) долженствовании
- c) правилах поведения в трудовом коллективе

**14. Основным принципом сестринской деятельности является:**

- a) гуманное отношение к пациенту
- b) уважение человеческого достоинства
- c) профессиональная компетентность

**15. Медицинская помощь в экстренной форме оказывается медицинской организацией и медицинским работником гражданину:**

- a) безотлагательно и бесплатно. Отказ в ее оказании не допускается

- b) безотлагательно и бесплатно. По согласованию с руководителем организации
- c) безотлагательно и бесплатно. В случае наличия полиса ОМС или ДМС

**16. Медицинская профилактика – это:**

- a) часть широкого комплекса межведомственных мер, направленных на укрепление здоровья населения и профилактику заболеваний
- b) действия, направленные на снижение отрицательного воздействия на здоровье факторов внешней среды
- c) оценка риска развития заболеваний

**17. Факторы риска для здоровья, кроме:**

- a) курение
- b) артериальная гипертензия
- c) алкоголизм
- d) ожирение
- e) гиподинамия
- f) употребление в пищу 400 гр. овощей и фруктов

**18. Школы здоровья – это:**

- a) медицинская профилактическая технология, основанная на совокупности индивидуального и группового воздействия на пациентов и направленная на повышение уровня их знаний
- b) образовательное учреждение, где учат здоровому образу жизни

**19. Кордиамин влияет на:**

- a) сосудодвигательный и дыхательные центры
- b) секреторную и двигательную активность пищеварительного тракта

**20. Средства, уменьшающие потребность сердца в кислороде и увеличивающие доставку кислорода к миокарду:**

- a) нитроглицерин и его пролонгированные препараты
- b) эналаприл

**21. При выявлении ЛП с истекшим сроком годности они должны храниться:**

- a) вместе со всеми ЛП
- b) нет особых указаний
- c) отдельно от других групп ЛП в специально выделенной и обозначенной (карантинной) зоне
- d) необходимо уничтожить

**22. Контроль за температурным режимом хранения вакцин осуществляется:**

- a) 1 раз в неделю
- b) 1 раз в день
- c) 1 раз в месяц
- d) 2 раза в день

**23. Антиген вызывает образование антител:**

- a) да

b) нет

**24. Сыворотки создают иммунитет:**

- a) активный
- b) пассивный

**25. Для повышения невосприимчивости населения к инфекционным болезням необходимо все, кроме:**

- a) полноценное питание
- b) витаминизация пищи
- c) прием антибиотиков
- d) здоровый образ жизни
- e) прививки

**26. Заражение столбняком происходит при:**

- a) укусе кровососущих насекомых
- b) употреблении инфицированной пищи и воды
- c) инфицировании ран
- d) вдыхании инфицированной пыли

**27. Неспецифическая профилактика гриппа:**

- a) изоляция больного
- b) масочный режим
- c) наложение карантина
- d) выделение и обследование контактных
- e) мытье рук
- f) все перечисленное верно

**28. Выбери 3 признака клинической смерти:**

- a) нет пульса на сонной артерии
- b) расширены зрачки
- c) отсутствие дыхания
- d) цианоз
- e) отсутствие пульса на лучевой терапии

**29. Продолжительность реанимации при признаках ее эффективности:**

- a) до восстановления жизнедеятельности
- b) 1 час
- c) 30 мин
- d) 5-6 мин
- e) 2 часа

**30. Компоненты тройного приема Сафара:**

- a) запрокидывание головы
- b) выдвижение нижней челюсти
- c) открытие рта

- d) введение воздуховода
- e) интубация

**31. Препараты, применяемые во время реанимации:**

- a) адреналин
- b) кальция хлорид
- c) строфантин
- d) преднизолон
- e) эуфиллин

**32. Показания к наложению жгута:**

- a) артериальное кровотечение
- b) венозное кровотечение
- c) любое кровотечение

**33. Способ промывания желудка при отравлении кислотами и щелочами:**

- a) промывать нельзя
- b) вызвать рефлекторную рвоту
- c) зондовое промывание после купирования болевого синдрома

**34. При артериальном кровотечении жгут накладывают не более, чем на:**

- a) 30 минут
- b) 60 минут
- c) 120 минут
- d) 180 минут

**35. Обморок - форма:**

- a) легочной недостаточности
- b) почечной недостаточности
- c) хронической сердечной недостаточности
- d) острой сосудистой недостаточности

**36. Тактика сестринского вмешательства при обмороке:**

- a) расстегнуть стесняющую одежду
- b) уложить ребенка с приподнятым головным концом
- c) применить нашатырный спирт ингаляционно
- d) использовать приемы тактильной стимуляции
- e) провести горячие ножные ванны
- f) уложить ребенка с приподнятым ножным концом

**37. Глубина прогиба грудины при массаже сердца у ребенка до года:**

- a) 2-3 см
- b) 1,5-2 см
- c) 4-5 см
- d) 7-8 см

**38. Укажите положение больного, обеспечивающее проходимость верхних дыхательных путей:**

- a) лежа на спине с приподнятым головным концом
- b) лежа на спине с запрокинутой головой назад
- c) лежа на боку с запрокинутой головой назад
- d) положение сидя с опущенной головой

**39. При ушибе в качестве первой помощи применяют:**

- a) согревающий компресс
- b) пузырь со льдом
- c) горячий компресс
- d) влажное обертывание

**40. Фебрильная температура тела (в град. С):**

- a) 39-40
- b) 38,1-39
- c) 37,1-38
- d) 36-37

**41. Энтеральным следует назвать способ введения лекарств:**

- a) внутримышечный
- b) внутривенный
- c) интраспинальный (в спинно-мозговой канал)
- d) через желудочно-кишечный тракт

**42. Вместимость 1 десертной ложки ( в мл):**

- a) 30
- b) 15
- c) 10
- d) 5

**43. Энтеральный путь введения лекарственных средств:**

- a) субконъюнктивальный
- b) ингаляционный
- c) внутрикожный
- d) ректальный (через прямую кишку)

**44. При несоблюдении правил асептики может возникнуть осложнение:**

- a) отек Квинке
- b) крапивница
- c) абсцесс
- d) анафилактический шок

**45. № приказа МЗ РФ «О мерах по улучшению учета, хранения, выписывания и использования наркотических лекарственных средств»:**

- a) 342

- b) 330
- c) 770
- d) 288

**46. При проведении венепункции игла располагается срезом:**

- a) вверх
- b) влево
- c) вниз
- d) вправо

**47. Частота сердечных сокращений новорожденного в мин:**

- a) 60-80
- b) 80-100
- c) 100-110
- d) 120-160

**48. Частота сердечных сокращений у детей от года до 8 лет:**

- a) 60-80
- b) 80-100
- c) 100-120
- d) 120-130

**49. Частота сердечных сокращений у детей младшего школьного возраста:**

- a) 60-80
- b) 90-100
- c) 100-110
- d) 110-120

**50. Характерные признаки обезвоживания ребенка:**

- a) громкий эмоциональный крик
- b) жажда
- c) беспокойство, потливость
- d) снижение тургора

**51. Меры первичной профилактики аллергической болезни:**

- a) оздоровление окружающей среды
- b) противорецидивное лечение
- c) санаторно-курортное лечение
- d) гигиеническое воспитание населения
- e) рациональное питание

**52. Клиническая картина пищевой аллергии может сопровождаться:**

- a) кожным зудом
- b) крапивницей
- c) бронхоспазмом
- d) повышением артериального давления

**53. Сестринский процесс при бронхиальной астме у детей:**

- a) обучение родителей навыкам оказания неотложной помощи при приступе
- b) контроль за выполнением назначений врача
- c) выбор медикаментозного лечения
- d) замена неэффективной терапии народными средствами
- e) создание гипоаллергенной обстановки

**54. Препарат выбора для оказания помощи при анафилактическом шоке:**

- a) адреналин
- b) димедрол
- c) кордиамин
- d) эуфилин

**55. Отхождение мокроты при продуктивном кашле улучшится, если провести:**

- a) кислородотерапию
- b) вибрационный массаж
- c) ультрафиолетовое облучение
- d) дыхательную гимнастику

**56. Симптомами острого стенозирующего ларинготрахеита являются все, кроме:**

- a) втяжение уступчивых мест грудной клетки
- b) "бочкообразная" грудная клетка
- c) осиплость голоса
- d) "лающий" кашель

**57. Оптимальное положение ребенка при судорогах:**

- a) горизонтальное на ровной мягкой поверхности
- b) с возвышенным головным концом
- c) с опущенным головным концом
- d) не имеет значения

**58. Признаки пневмонии у детей грудного возраста:**

- a) влажный кашель
- b) втяжение уступчивых мест грудной клетки
- c) цианоз носогубного треугольника
- d) выбухание большого родничка
- e) урежение дыхания

**59. Приподнятое головное положение рекомендуется при:**

- a) пневмонии
- b) врожденном пороке сердца
- c) пиелонефрите
- d) пиодермии

**60. Сестринский процесс при врожденном пороке сердца:**



- a) умение подсчета пульса, числа сердечных сокращений, дыхательных движение
- b) подача кислорода до и после кормления
- c) краниогипотермия
- d) выполнение манипуляций в постели
- e) тугое пеленание
- f) обучение матери навыкам ухода

**61. Ребенку с декомпенсированным пороком сердца, находящемуся на строгом постельном режиме, полную санитарную обработку можно заменить:**

- a) лечебной ванной
- b) душем
- c) гигиенической ванной
- d) обтиранием тела и подмыванием в постели

**62. Ревматизм может развиться после заболеваний:**

- a) кори
- b) скарлатины
- c) дифтерии
- d) ветряной оспы
- e) ангины

**63. Первичная профилактика ревматизма:**

- a) санация очагов хронической инфекции
- b) плановая вакцинация
- c) закаливание
- d) ограничение физической активности

**64. При подсчете пульса артерию к лучевой кости прижимают:**

- a) одним пальцем
- b) двумя пальцами
- c) тремя пальцами
- d) всеми пальцами кисти

**65. Сестринские рекомендации при анемии:**

- a) полноценное витаминизированное питание
- b) контроль за клиническими анализами крови
- c) контроль за анализами мочи
- d) правильно принимать препараты железа
- e) контроль за коагулограммой

**66. Побочные действия при лечении препаратами железа:**

- a) рвота
- b) понос
- c) запор
- d) черный кал

- е) мелена

**67. Клинические симптомы пиелонефрита:**

- а) дизурия
- б) гипертензия
- с) боли в животе, в поясничной области
- д) олигурия, отеки
- е) высокая лихорадка

**68. Сестринские рекомендации по диетотерапии ребенку с пиелонефритом:**

- а) ограничение поваренной соли
- б) ограничение жидкости
- с) ограничение белка в диете
- д) прием минеральной воды
- е) увеличение молочно-кислых продуктов

**69. Сестринский процесс при сахарном диабете:**

- а) научить правильно вводить инсулин
- б) проводить контроль диастазы мочи
- с) контролировать соблюдение диеты
- д) научить расчету питания по хлебным единицам
- е) обучить самоконтролю состояния
- ф) контролировать коагулограмму крови

**70. Клинические симптомы стоматита:**

- а) цианоз носогубного треугольника
- б) слюнотечение
- с) патологические изменения на слизистой
- д) отказ от еды
- е) диспноэ

**71. Клинические симптомы молочницы:**

- а) дискомфорт при сосании
- б) гипертермия
- с) гнойные пузырьки на слизистой рта
- д) белые творожистые налеты на слизистой рта

**72. Пути заражения энтеробиозом:**

- а) воздушно-капельный
- б) алиментарный
- с) парентеральный
- д) самозаражение
- е) контактно-бытовой

**73. Источник заражения туберкулезом:**

- а) больной человек

- b) насекомые
- c) крупный рогатый скот, свиньи
- d) грызуны

**74. Иммунопрофилактика туберкулеза новорожденным проводится:**

- a) на 3-5 день
- b) на 7-8 день
- c) на 10-14 день
- d) на 28 день

**75. Проба Манту оценивается через:**

- a) 12 часов
- b) 24 часа
- c) 72 часа

**76. Периоды развития инфекционного заболевания:**

- a) продромальный
- b) разгара
- c) инкубационный
- d) реконвалесценции
- e) все ответы верны

**77. Основные симптомы краснухи:**

- a) увеличение затылочных лимфоузлов
- b) пятнисто-папулезная, мелкая сыпь
- c) увеличение околоушных слюнных желез
- d) спазматический кашель
- e) пятна Филатова-Коплика
- f) умеренно выраженные катаральные явления

**78. Пути передачи инфекции при менингококковой инфекции:**

- a) воздушно-капельный
- b) контактно-бытовой
- c) парентеральный
- d) трансплацентарный

**79. Основные симптомы дифтерии зева:**

- a) трудноотделяемые налеты серо-белого цвета
- b) увеличение регионарных лимфоузлов
- c) увеличение затылочных лимфоузлов
- d) спазматический кашель
- e) отек подкожно-жировой клетчатки шеи

**80. Характерные клинические симптомы дизентерии:**

- a) стул жидкий со слизью, прожилками крови, без каловых масс
- b) стул брызжущий, оранжевый

- c) тенезмы
- d) упорная рвота
- e) сфинктерит

**81. Диета, при вирусном гепатите обогащается за счет:**

- a) белков
- b) животных жиров
- c) углеводов
- d) витаминов

**82. Для специфической профилактики инфекционных заболеваний применяют:**

- a) витамины
- b) вакцины
- c) бактериофаги
- d) антибиотики

**83. Признаки тяжелой прививочной реакции:**

- a) повышение температуры до 38-39 градусов
- b) кашель
- c) фебрильные судороги
- d) гиперемия, отек более 8 см. на месте введения вакцины

**84. Для оказания неотложной помощи при анафилактическом шоке используют препараты:**

- a) адреналин
- b) преднизолон
- c) супрастин
- d) фенobarбитал
- e) атропин

**85. После проведения вакцинации сестра прививочного кабинета должна наблюдать за ребенком в течение:**

- a) 30-ти минут
- b) 1-го часа
- c) 2-х часов
- d) 3-х часов

**86. Признаки местной прививочной реакции на вакцинацию:**

- a) болезненный инфильтрат
- b) гиперемия кожи
- c) регионарный лимфаденит
- d) крапивница
- e) абсцесс
- f) некротическое поражение тканей

**87. Заболевания, для профилактики, которых необходима плановая ревакцинация:**

- a) вирусный гепатит В
- b) бешенство
- c) грипп
- d) полиомиелит
- e) дифтерия
- f) эпидемический паротит

**88. Клинические симптомы второго периода лихорадки:**

- a) повышенное потоотделение
- b) сухость во рту
- c) озноб
- d) резкое снижение АД
- e) чувство жара

**89. Тактика сестринского вмешательства во втором периоде лихорадки:**

- a) растереть кожу раствором столового уксуса
- b) положить холодный компресс на лоб
- c) приложить грелку к ногам
- d) положить холод на магистральные сосуды
- e) обеспечить обильным питьем
- f) провести горячие ножные ванны

**90. К жаропонижающим средствам относятся:**

- a) парацетамол
- b) ампицилин
- c) седуксен
- d) панадол

**91. Смена молочных зубов начинается:**

- a) в 3 года
- b) в 4 года
- c) в 5-6 лет
- d) в 7-8 лет

**92. Физиологический гипертонус мышц сгибателей верхних конечностей исчезает к возрасту:**

- a) 1 месяц
- b) 2 месяца
- c) 3 месяца
- d) 4 месяца

**93. Сроки закрытия большого родничка:**

- a) 6 месяцев
- b) 8-10 месяцев
- c) 12-16 месяцев

d) 18-24 месяца

**94. Частота дыхания в возрасте 1-2 года:**

- a) 40-60 в минуту
- b) 30-35 в минуту
- c) 20-25 в минуту
- d) 16-18 в минуту

**95. Частота пульса у ребенка 1 года за 1 минуту:**

- a) 140-160
- b) 110-120
- c) 90-100
- d) 70-80

**96. При измерении АД на нижних конечностях манжетка накладывается на:**

- a) верхнюю треть бедра
- b) нижнюю треть бедра
- c) на голень
- d) на стопу

**97. Частота мочеиспусканий в сутки в периоде новорожденности:**

- a) 5-6
- b) 10-12
- c) 15-18
- d) 20-25

**98. Коревая вакцина может вводиться детям после иммунизации другими вакцинами:**

- a) на следующий день
- b) через неделю
- c) через 20 дней
- d) через 30 дней
- e) через 60 дней

**99. Метод введения иммунных препаратов против дифтерии:**

- a) пероральный
- b) подкожный
- c) внутримышечный
- d) накожный
- e) внутрикожный

**100. Сроки проведения вакцинации против гепатита В новорожденным:**

- a) первые 12 часов
- b) 24 часа жизни
- c) 36 часов жизни
- d) на 3-й день

**101. При попадании биологической жидкости (кровь) пациента на слизистую носа мед.работника для обработки рекомендуется:**

- a) промыть 2% раствором протаргола, 0,05% раствор перманганата калия
- b) промыть 20% раствором сульфацила натрия
- c) промыть большим количеством воды

**102. Наиболее верное утверждение:**

- a) области случаев профессионального заражения мед.работников ВИЧ – инфекцией не зарегистрировано;
- b) в области зарегистрированы единичные случаи профессионального заражения мед.работников ВИЧ – инфекцией;
- c) риск инфицирования ВИЧ при половых контактах у мужчин выше, чем у женщин;
- d) риск инфицирования ВИЧ при половых контактах у женщин выше, чем у мужчин.

**103. Дотестовое консультирование ПО ВИЧ – инфекции включает:**

- a) получение информированного согласия пациента на обследование в письменном виде;
- b) обязательный осмотр перед обследованием;
- c) обучение безопасному в плане заражения ВИЧ поведению.

**104. Укажите используемые в медицинской практике коды и показания для обследования на антитела к ВИЧ:**

- a) 108 код – доноры биологических жидкостей;
- b) 104 код – лица с подозрением или установленным заболеванием передающимся половым путем;
- c) 107 код – реципиенты биологических жидкостей.

**105. К каким видам внешнего воздействия устойчив ВИЧ?**

- a) ультрафиолетовому облучению и ионизирующей радиации;
- b) воздействию низких температур;
- c) воздействию дезинфицирующих (вирулоцидных) средств.

**106. Является ли показателем инфицированности новорожденного присутствие у него в организме антител к ВИЧ?**

- a) да;
- b) нет;
- c) зависит от клинической стадии заболевания матери.

**107. Работники каких профессий, учреждений подлежат тестированию на антитела к ВИЧ:**

- a) мед.персонал специализированных учреждений по ВИЧ – инфекции, связанный непосредственно с диагностикой, обследованием, лечением и обслуживанием ВИЧ – инфицированных;
- b) инфекционисты, стоматологи;
- c) мед.персонал родильных домов, отделений;
- d) мед.персонал клинико-диагностических лабораторий;
- e) мед.персонал пунктов переливания крови;
- f) работники хирургических отделений.

**108. При каких процедурах возможно заражение пациента?**

- a) переливание крови и ее компонентов;
- b) трансплантация органов и тканей;
- c) оперативное вмешательство;
- d) физиотерапевтические процедуры;
- e) массаж;
- f) экстракорпоральное оплодотворение;
- g) визуальный осмотр.

**109. Передача ВИЧ – инфекции от матери ребенку возможна:**

- a) во время беременности;
- b) во время родов;
- c) при грудном вскармливании;
- d) при уходе за ребенком.

**110. В случае аварийной ситуации (несчастного случая на производстве) при обслуживании ВИЧ – инфицированного – прокол перчатки иглой – Вы должны:**

- a) сообщить родственникам больного о произошедшей аварийной ситуации
- b) снять перчатки, вымыть руки с мылом, обработать 70% этиловым спиртом и смазать рану 5% спиртовым раствором йода
- c) провести дезинфекцию биологического материала, вызвавшего аварию
- d) зарегистрировать несчастный случай на производстве в специальном журнале
- e) взять расписку с больного о том, когда он был последний раз обследован на наличие антител к ВИЧ
- f) поставить в известность об аварии вышестоящее руководство
- g) обследоваться медработнику на наличие антител к ВИЧ (экспресс-тестами + доставка пробы крови в лабораторию)
- h) составить акты о несчастном случае на производстве
- i) обратиться к доверенному врачу
- j) желательно в первые 2 часа (но не позднее 72 часов) начать ВААРТ
- k) провести эпидрасследование факта аварии
- l) взять расписку медработника об отсутствии у него гепатита.