

**ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
«ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО»
Высшая категория**

1. Деконтаминация – это:

- a) инактивация вирусов
- b) снижение количества микроорганизмов на объектах
- c) уничтожение бактерий

2. Стетоскоп и сантиметровая лента обрабатывается:

- a) двукратным протиранием хлорамином
- b) фурацилином
- c) 5% перманганатом калия
- d) 5% йодом

3. Предстерилизационная очистка необходима для:

- a) удаления жиров, белков, лекарственных средств,
- b) улучшения эффективности стерилизации
- c) снижения риска пирогенных реакций
- d) все перечисленное верно

4. Свойство дезинфицирующего раствора, характеризующее способность вызывать гибель вирусов:

- a) туберкулоцидность
- b) вирулентность
- c) бактерицидность
- d) вирулицидность

5. Способ обработки рук при котором удаляется транзитная м/флора и снижается численность резидентной микрофлоры:

- a) социальный
- b) гигиенический
- c) хирургический

6. При попадании биологической жидкости на кожу, надо:

- a) промыть кожу водой с мылом
- b) обработать 70 градусным спиртом, водой с мылом и еще раз 70 градусным спиртом - контакт с кожей - 2 мин
- c) обработать 1% раствором хлорамина
- d) обработать 0,05% раствором перманганата калия

7. Естественная среда обитания и резервуар стафилококка в организме человека:

- a) кишечник
- b) мочевыделительная система
- c) передние отделы носа
- d) слизистые оболочки глаз

8. Минимальная инфицирующая доза крови при гепатите «В» составляет:

- a) 0.001 мл
- b) 0.0001 мл
- c) 0.00001 мл
- d) 0.000001 мл
- e) 0.0000001 мл

9. К ятрогенным заболеваниям относят:

- a) обусловленные вредными факторами производства
- b) обусловленные неосторожными действиями или высказываниями медработников
- c) психические заболевания
- d) заболевания с неблагоприятным прогнозом

10. На какие цели расходуются бюджетные средства в здравоохранении:

- a) на финансирование целевых программ
- b) на оказание медицинской помощи пациентам, застрахованным по ДМС
- c) на питание пациентов в стационарах, работающих в системе ОМС
- d) на оплату медицинских работников, работающих в системе ОМС

11. Категориями этики являются:

- a) долг
- b) честь
- c) достоинство
- d) совесть
- e) всё перечисленное верно

12. Обязательно ли согласие родителей на медицинское вмешательство в отношении ребенка до 15 лет:

- a) да
- b) нет

13. Медицинская профилактика – это:

- a) действия, направленные на снижение вероятности возникновения определенных заболеваний или дисфункций у человека, семьи, группы и населения в целом
- b) действия, направленные на снижение отрицательного воздействия на здоровье факторов внешней среды

14. Основная цель гигиенического обучения:

- a) формирование мотивации на укрепление и сохранение здоровья
- b) проведение диспансеризации
- c) проведение оздоровительных и лечебных мероприятий

15. Взаимодействие между людьми определяется следующим компонентом общения:

- a) коммуникативная сторона
- b) перцептивная сторона
- c) интерактивная сторона

16. Факторы, которые служат причиной непонимания людей в «психологии общения», называют:

- a) препоны
- b) преграды
- c) барьеры
- d) препятствия

17. Асцит, варикозное расширение вен пищевода, увеличение селезенки - признаки застоя:

- a) в системе воротной вены
- b) в малом кругу
- c) в большом кругу

18. Тяжесть тиреотоксикоза определяется по изменениям:

- a) глаз
- b) центральной нервной системы
- c) обмена веществ
- d) вегетативной нервной системы
- e) сердечно-сосудистой системы

19. Ведущими симптомами в клинике хронического гнойного бронхита являются:

- a) кашель
- b) выделение гнойной мокроты
- c) одышка
- d) интоксикация

20. Жизненным показанием для введения глюкокортикостероидов на доврачебном этапе является:

- a) обычный приступ астмы
- b) астматический статус

21. Показанием для экстренной госпитализации являются формы стенокардии:

- a) напряжения, стабильная
- b) нестабильная, впервые возникшая

22. Пароксизмальная желудочковая тахикардия и желудочковые экстрасистолы при остром инфаркте миокарда могут осложняться:

- a) асистолией
- b) фибрилляцией желудочков
- c) мерцательной аритмией

23. Острый крупноочаговый инфаркт миокарда проявляет себя появлением на ЭКГ:

- a) патологически расширенного зубца S
- b) патологически расширенного зубца Q
- c) подъема сегмента ST и появление отрицательного зубца T

24. Укажите случай одышки, которую можно назвать экспираторной:

- a) учащенное поверхностное дыхание при хронической недостаточности кровообращения
- b) затрудненный шумный вдох при стенозе гортани
- c) затрудненный выдох вследствие спазма бронхов при бронхиальной астме

25. Гериатрия - это наука о:

- a) долгожителей
- b) закономерности старения
- c) лечении лиц пожилого и старческого возраста
- d) профилактике старения

26. К синдромам, характерным для сахарного диабета не относится:

- a) полиурия
- b) полидипсия
- c) полифагия
- d) уремия

27. Какой метод исследования, применяемый для диагностики пороков сердца, является наиболее информативным?

- a) ЭКГ
- b) общий анализ крови
- c) флюорография сердца
- d) эхокардиография
- e) биохимический анализ крови

28. Какие изменения можно обнаружить в моче в момент приступа почечной колики?

- a) пиурия
- b) гематурия
- c) глюкозурия
- d) альбуминурия

29. Повышение уровня креатинина в моче достоверный признак:

- a) ИБС
- b) атеросклероза
- c) ХПН

30. Описторхи паразитируют у инвазированных в:

- a) крови
- b) почки
- c) протоки печени

31. Нормотропный водитель ритма:

- a) синусовый узел
- b) пучок Гиса

32. Первая помощь при открытом пневмотораксе:

- a) блокада места перелома ребер

- b) обезболивание наркотическими средствами
- c) наложение окклюзионной герметизирующей повязки
- d) коникотомия
- e) введение антибиотиков

33. Ведущий признак ожогового шока:

- a) высокая температура тела
- b) снижение АД
- c) частый нитевидный пульс
- d) олигоанурия

34. Характерными симптомами для переломов основания черепа является:

- a) сильные головные боли
- b) головокружения
- c) истечение крови и жидкости из наружного слухового прохода

35. Достоверным клиническим признаком прободной язвы 12-перстной кишки является:

- a) рвота желудочным содержимым
- b) доскообразный живот (мышечное напряжение передней брюшной стенки)
- c) рвота типа «кофейной гущи»

36. Помощь пациенту с синдромом длительного сдавления при отсутствии признаков гибели конечности:

- a) наложение жгута
- b) направление на прием
- c) введение кровезаменителей
- d) обезболивание, тугое бинтование, иммобилизация, холод, борьба с шоком, транспортировка

37. Тактика при впервые возникшей печеночной колике:

- a) введение анальгетиков
- b) введение спазмолитиков
- c) экстренная госпитализация без введения медикаментов

38. Воздушная эмболия может возникнуть при:

- a) артериальном кровотечении
- b) капиллярном кровотечении
- c) ранении шейных вен
- d) ранении сонной артерии

39. Дегтеобразный стул /мелена/ характерен для:

- a) желудочно-кишечного кровотечения
- b) новообразования прямой кишки
- c) кровотечения в брюшную полость
- d) перитонита

40. Хирургическое лечение ущемленной грыжи у взрослых можно заменить:

- a) ношением брюшного корсета
- b) ограничением чрезмерной физической нагрузки
- c) постельным режимом
- d) ничем из перечисленного

41. Калькулезный холецистит лечится:

- a) терапевтически
- b) хирургически
- c) соблюдением диеты
- d) оптимального способа лечения нет

42. Укажите причины развития сухой гангрены:

- a) нарушение артериального кровообращения без участия инфекции
- b) ушиб мягких тканей
- c) расстройство венозного кровообращения с участием инфекции
- d) переломы костей без смещения

43. Секвестр - это:

- a) инфекция кости
- b) ломкость кости
- c) мертвый участок кости
- d) неправильное развитие кости

44. Холодный абсцесс является симптомом:

- a) туберкулезного артрита
- b) остеомиелита
- c) ревматоидного артрита
- d) полиартрита

45. Методы лечения вывихов:

- a) шунтирование
- b) некрэктомия
- c) вправление
- d) тугое бинтование

46. Овуляцией называется:

- a) погружение яйцеклетки в эндометрий
- b) слияние гамет
- c) выход яйцеклетки из граафова пузырька
- d) дробление зиготы

47. Свертывающие свойства крови к концу нормальной беременности:

- a) повышены
- b) понижены

- c) не изменены
- d) можно не учитывать для прогноза родов

48. Второй период родов называется периодом:

- a) раскрытия
- b) изгнания
- c) прелиминарным
- d) предвестниковым

49. Пиурия и бактериурия является у беременной признаком:

- a) раннего гестоза
- b) позднего гестоза
- c) пиелонефрита
- d) диабета

50. При неполном аборте:

- a) показано выскабливание полости матки
- b) возможно сохранение беременности
- c) проводится выжидательная тактика
- d) возможно лечение в дневном стационаре

51. Абсолютным показанием к операции кесарево сечение является:

- a) миопия средней степени
- b) тазовое предлежание
- c) полное предлежание плаценты
- d) ложное прикрепление плаценты

52. Мини аборт разрешено проводить при сроке:

- a) 4-5 недель
- b) 6 недель
- c) 8 недель
- d) до 12 недель

53. Противопоказанием к приему гормональных контрацептивов является:

- a) тромбофлебит
- b) миопия средней степени
- c) обильные месячные
- d) 2 аборта в анамнезе

54. Диагностическое выскабливание полости матки показано при:

- a) метроррагии
- b) альгоменоррее
- c) эндометриозе
- d) эндометрите

55. К гонорее нижних отделов половой системы женщины относится:

- a) эндометрит
- b) эндоцервицит
- c) сальпингит
- d) сальпингоофорит

56. Предраковые заболевания наружных половых органов:

- a) крауроз и лейкоплакия вульвы
- b) вульвит
- c) варикоз
- d) бартолинит

57. Профилактический осмотр молочных желез:

- a) может проводить только хирург
- b) проводится при каждом профилактическом гинекологическом обследовании женщины
- c) может проводить только гинеколог
- d) не может проводить акушерка

58. К первичной профилактике бронхиальной астмы не относится:

- a) экологическая безопасность
- b) отказ от содержания домашних животных
- c) закаливание
- d) рациональное питание
- e) отказ от вакцинаций

59. Гипертермия требует медицинского вмешательства, так как возможно развитие:

- a) диареи
- b) судорог
- c) стеноза гортани
- d) синдрома дыхательных расстройств

60. Ребенку с декомпенсированным пороком сердца, находящемуся на строгом постельном режиме, полную санитарную обработку можно заменить:

- a) лечебной ванной
- b) душем
- c) гигиенической ванной
- d) обтиранием тела и подмыванием в постели

61. Характер болей при ревматическом полиартрите:

- a) "летучие" непродолжительные
- b) умеренные продолжительные
- c) ночные мучительные
- d) постоянные

62. Для диагностики аскаридоза исследуют:

- a) рвотные массы
- b) перианальный соскоб

- c) мочу
- d) фекалии

63. Доза введения пробы Манту:

- a) 0,1 мл (2 ТЕ)
- b) 0,2 мл (4 ТЕ)
- c) 0,5 мл (10 ТЕ)
- d) 1 мл (10 ТЕ)

64. Какова частота пульса у ребенка грудного возраста.

- a) 120-140 в 1 минуту
- b) 100-120 в 1 минуту
- c) 80-100 в 1 минуту
- d) 140-160 в 1 минуту

65. С какими рефлексами рождается ребенок.

- a) безусловными
- b) условными
- c) приобретенными

66. Сколько жидкости надо приготовить для промывания желудка ребенка 6 лет:

- a) 1 литр на год жизни
- b) 500 мл на год жизни
- c) 1 литр на кг массы

67. Каково соотношение непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких новорожденным (по 28 день):

- a) 3:1
- b) 4:1
- c) 5:1

68. Какой из предложенных причин анемии чаще всего встречается у детей 1-го года жизни:

- a) постгеморрагический
- b) врожденный
- c) инфекционный
- d) алиментарный

69. Ребенок, заболевший коклюшем, наиболее заразен в периоды:

- a) на протяжении всего заболевания
- b) только в катаральном периоде
- c) в катаральном периоде и в первые две недели спазматического периода

70. Какие симптомы указывают на тяжесть приступа бронхиальной астмы:

- a) гиперемия кожных покровов
- b) акроцианоз
- c) субфебрильная температура тела

71. Симптомы стенозирующего ларинготрахеита:

- a) грубый, лающий кашель, шумное дыхание втяжение межреберных мышц, цианоз носогубного треугольника
- b) «петушиный крик», цианоз носогубного треугольника
- c) влажный кашель, одышка. Участие в акте дыхания вспомогательной мускулатуры

72. Доврачебная тактика при разрыве барабанной перепонки:

- a) закапывание раствора 30% сульфацила натрия
- b) удаление сгустков крови
- c) введение в слуховой проход стерильной турунды из ваты или марли

73. Помощь в случае инородного (живого) тела в ухе:

- a) введение масляного раствора в наружный слуховой проход
- b) удаление насекомого пинцетом

74. Онихомикоз:

- a) вирусное поражение волос
- b) грибковое поражение волос
- c) грибковое поражение ногтевых пластинок

75. Какой возбудитель вызывает опоясывающий герпес (лишай):

- a) вирус тропный к мышечной ткани
- b) стафилококк
- c) вирус тропный к нервной ткани

76. Первая помощь при электроофтальмии:

- a) дезинфицирующие капли
- b) обезболивающие капли
- c) витаминные капли

77. При жалобе на гнойное отделяемое назначается:

- a) капли снижающие внутриглазное давление
- b) дезинфицирующие капли
- c) витаминные капли

78. При тяжелом ранении глаза с разрушением оболочек транспортировка

- a) лежа на носилках с монокулярной повязкой
- b) лежа на носилках с бинокулярной повязкой
- c) пешком

79. Соотношение вдувания воздуха и массажа сердца, проводимые одним лицом:

- a) 2:30
- b) 2:15
- c) 2:4-6

80. Продолжительность реанимации при признаках ее эффективности:

- a) до восстановления жизнедеятельности

- b) 1 час
- c) 30 мин
- d) 5-6 мин
- e) 2 часа

81. Частота компрессий сердца (в мин):

- a) 40
- b) 60
- c) 80
- d) 100

82. Разовая доза адреналина при реанимации взрослых:

- a) 0,1-0,2 мг
- b) 0,3-0,5 мг
- c) 0,5-1 мг
- d) 1-2 мг
- e) 10-15 мг

83. Максимальное время развития анафилактического шока после парентерального введения лекарства:

- a) 5 мин
- b) 20 мин
- c) 30 мин
- d) 1 час
- e) 2 часа

84. Помощь больному с синдромом длительного сдавления при отсутствии признаков гибели конечности:

- a) жгут
- b) направление на прием
- c) введение кровезаменителей
- d) обезболивание, иммобилизация, холод, борьба с шоком, транспортировка

85. Территория, подвергнутая действию сильнодействующих паров, ядовитых веществ, называется:

- a) очагом химического заражения
- b) зоной химического заражения

86. Антидот при отравлении ФОС (карбофос, дихлофос и т.д.):

- a) атропин
- b) прозерин
- c) метиленовый синий
- d) унитиол

87. Угарный газ в первую очередь поражает:

- a) дыхательный центр

- b) кровообращение
- c) транспорт кислорода

88. Доврачебная помощь при термических ожогах 1-2 степеней:

- a) введение дыхательных analeптиков
- b) обмывание пораженной части холодной водой
- c) обмывание теплой водой
- d) местное применение мазей

89. Атипичная форма инфаркта миокарда:

- a) аритмическая
- b) ишемическая
- c) нефротическая
- d) геморрагическая

90. Тактика фельдшера при подозрении на синдром "острый живот" у больного:

- a) ввести анальгетики и вызвать врача
- b) ввести спазмолитики и вызвать врача
- c) ничего не вводить, немедленно вызвать врача
- d) поставить очистительную клизму и наблюдать за больным
- e) промыть желудок и наблюдать за больным

91. Закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения предусматривает:

- a) санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы
- b) уголовную ответственность и правовое регулирование деятельности ЛПУ

92. Продолжительность инкубационного периода при чуме:

- a) от нескольких часов до 6 дней
- b) от нескольких часов до 2 месяцев

93. На 2 день после прививки адсорбированным столбнячным анатоксином на месте инъекции обнаружено слегка болезненное уплотнение. О чем это свидетельствует?

- a) это признак осложнения
- b) это нормальное течение вакцинального процесса

94. Пациент с вирусным гепатитом наиболее заразен в:

- a) желтушный период
- b) инкубационный период
- c) продромальный период

95. Дефицит пульса – это:

- a) разница между ЧСС и пульсом на периферических артериях
- b) разница пульса на левой и правой руках

96. Учащение пульса в 1 мин при повышении температуры тела на 1 градус (в ударах):

- a) 20
- b) 10
- c) 2

97. Передняя тампонада носа проводится при:

- a) остром рините
- b) хроническом рините
- c) носовом кровотечении

98. Холодовая цепь - система, включающая:

- a) холодильное оборудование и расположенные в нем вакцины
- b) специально подготовленный персонал, холодильное оборудование и расположенные в нем вакцины
- c) специально подготовленный персонал, холодильное оборудование и систему контроля за соблюдением температурного режима
- d) холодильное оборудование и систему контроля за соблюдением температурного режима

99. Единица учета запасов вакцин:

- a) упаковка
- b) ампула
- c) доза
- d) флакон

100. В морозильнике для замораживания хладоэлементов или хранения живых вакцин температура должна быть в пределах:

- a) от -10°C до -15°C
- b) от -15°C до -25°C
- c) от -10°C до -25°C
- d) от -20°C до -25°C

101. Клинический диагноз ВИЧ – инфекции (стадия течения) может быть установлен на основании:

- a) клинической картины
- b) эпиданамнеза
- c) данных лабораторного исследования
- d) по наличию антител к ВИЧ
- e) по наличию туберкулеза у ВИЧ – инфицированного

102. Использование двух перчаток в случае прокола контаминированной иглой от ВИЧ – инфицированного пациента:

- a) не влияет на риск заражения
- b) значительно снижает риск заражения
- c) исключает риск заражения
- d) снижает риск заражения в 150 раз

103. Выберите строку, где перечислены только действующие в настоящее время коды для направлений при обследовании на антитела к ВИЧ:

- a) 102, 104, 108, 109, 112, 113, 117, 115, 126, 121, 123, 124, 127, 300
- b) 102, 103, 104, 108, 113, 115, 118, 120, 112, 200, и в качестве дополнительного 127
- c) 100, 103, 104, 108, 109, 113, 112, 117, 118, 126, 127, 125, 200, 300.

104. Укажите материал, который используется для определения наличия антител к ВИЧ:

- a) желудочный сок
- b) сыворотка крови
- c) кровь
- d) слизь из зева
- e) замороженная сыворотка крови
- f) любая биологическая жидкость человека

105. Как трактуется обнаружение антител к ВИЧ в крови человека:

- a) антитела защищают от возможного заражения ВИЧ – инфекций
- b) пациент ВИЧ – инфицированный
- c) пациент находится в инкубационном периоде
- d) ребенок шестимесячного возраста, родившийся от ВИЧ – инфицированной матери
- e) пациент болен туберкулезом

106. Продолжительность дезинфекции изделий медицинского назначения (класса Б), которые были использованы для обслуживания ВИЧ – инфицированного, при использовании 3% самаровки составляет:

- a) в течение суток
- b) не используется
- c) продолжительность не уточнена
- d) 3-6 часов
- e) при истекших сроках годности дезинфектанта может продляться до 3 часов
- f) все выше перечисленное неправильно

107. Действия медработника при загрязнении халата кровью:

- a) пятно обработать 1% раствором лизофина в течение 60 минут, или другой дезинфектант в режиме на парентеральные инфекции, выдерживая время экспозиции по инструкции
- b) халат сдать в стирку или для автоклавирования
- c) кожу под халатом обработать 70-градусным спиртом или другим антисептиком
- d) срочно снять халат и замочить в 5% хлорамине на 3-4 часа
- e) учитывая очень высокую опасность заражения парантеральными инфекциями, срочно обследоваться на ВИЧ
- f) учитывая очень высокую опасность заражения, обследовать на ВИЧ пациента, от которого была разлита кровь
- g) продлит время дезинфекции халата на 30 минут, учитывая опасность заражения парантеральными инфекциями

108. Перечислите ко-факторы для заражения ВИЧ – инфекцией:

- a) анальный секс
- b) петтинг

- c) гомосексуальные половые контакты
- d) частая смена постоянного партнера
- e) травмирование слизистой и кожи половых органов при половых контактах
- f) наличие заболеваний передающихся половым путем
- g) половые контакты с лицом, употребляющим в/в наркотические препараты
- h) использование растворов для обработки половых органов
- i) использование сексуального белья

109. Перечислите, что нужно сделать при аварийной ситуации в случае обслуживания ВИЧ – инфицированного:

- a) поставить в известность зав.отделением или вышестоящего по должности медработника
- b) обратиться к доверенному по ВИЧ – инфекции врачу ЛПУ с целью коррекции постконтактного лечения и последующего наблюдения и обследования через 3, 6, 9, 12мес.
- c) срочно выполнить генеральную уборку
- d) зарегистрировать в журнале учета несчастных случаев
- e) начать принимать калетру (лопинавир/ритонавир) + комбивир
- f) составить акты о несчастном случае на производстве
- g) оказать себе самопомощь и организовать дезинфекцию
- h) срочно принять антибиотики
- i) сообщить о ситуации родственникам больного
- j) медработнику пройти обследование на наличие антител к ВИЧ экспрестестами с последующим обследованием через лабораторию
- k) рекомендуется медработникам – женщинам сделать тест на беременность

110. Как можно назвать состояние распространенности ВИЧ – инфекции в мире:

- a) эпидемия
- b) спорадическая заболеваемость
- c) пандемия