

**ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
«НАРКОЛОГИЯ»
Вторая категория**

- 1. Прогрессиентность алкоголизма оценивается по:**
 - a) скорости нарастания изменений личности
 - b) длительности запоев
 - c) длительности ремиссий
 - d) длительности периода от начала систематического пьянства до формирования алкогольного абстинентного синдрома

- 2. По медицинским показаниям наркотики назначают:**
 - a) онкологическим пациентам
 - b) терапевтическим пациентам
 - c) стоматологическим пациентам
 - d) наркологическим пациентам

- 3. К конечной стадии течения наркомании относится все перечисленное, кроме:**
 - a) кахексии
 - b) полной деградации личности
 - c) абстиненции
 - d) повышения толерантности

- 4. При проведении предрейсового медицинского осмотра медицинские работники заполняют:**
 - a) протокол контроля трезвости
 - b) акт медицинского освидетельствования на состояние опьянения
 - c) протокол медицинского освидетельствования для установления факта употребления алкоголя и состояния опьянения
 - d) справка о состоянии освидетельствования

- 5. ВИЧ-инфекция чаще возникает у наркоманов, употребляющих наркотики:**
 - a) внутривенно
 - b) перорально
 - c) не зависимо от способа введения
 - d) интраназально

- 6. Полинаркомания – это:**
 - a) одновременное злоупотребление несколькими наркотическими веществами
 - b) повышение дозы наркотического вещества
 - c) алкоголизм в сочетании с наркоманией
 - d) употребление сильнодействующих препаратов

- 7. Для первой стадии алкоголизма характерны все перечисленные симптомы, кроме:**
 - a) утраты количественного и ситуационного контроля

- b) роста толерантности
 - c) амнезии отдельных периодов опьянения
 - d) абстинентного синдрома
- 8. Для первой стадии алкоголизма наиболее характерна форма пьянства в виде:**
- a) постоянного пьянства на фоне повышенной толерантности
 - b) коротких двух-трех дневных псевдозапоев
 - c) частых однодневных эксцессов
 - d) перемежающего пьянства
 - e) истинных запоев
- 9. В третьей стадии алкоголизма наиболее часто встречаются следующие формы злоупотребления алкоголем:**
- a) постоянное пьянство с высокой толерантностью
 - b) истинные запои
 - c) псевдозапои
 - d) постоянное пьянство с низкой толерантностью
- 10. Для средней степени алкогольного опьянения характерно все перечисленное, кроме:**
- a) нарушения речи
 - b) нарушения походки
 - c) неустойчивости в позе Ромберга
 - d) слабого запаха алкоголя изо рта
- 11. Для тяжелой степени алкогольного опьянения характерно все перечисленное, кроме:**
- a) нарушения сознания, ориентировки
 - b) нарушения походки
 - c) неточности выполнения точных движений
 - d) дрожания век, языка, пальцев рук
- 12. Для алкогольной комы характерно все перечисленное, кроме:**
- a) нарушение сознания
 - b) сужение зрачков
 - c) снижение рефлексов
 - d) повышение температуры
- 13. Остаточные явления предшествующего алкогольного опьянения коррелируют с концентрацией алкоголя в крови:**
- a) 0,022 - 1%
 - b) 1 - 2%
 - c) 2 - 3%
 - d) 3 - 4%
- 14. Нарезко выраженные признаки абстинентного синдрома наблюдаются при употреблении:**

- a) опиатов
- b) препаратов конопли
- c) стимуляторов
- d) барбитуратов

15. При купировании возбуждения в случаях отравления димедролом назначают:

- a) прозерин и реланиум
- b) прозерин и дроперидол
- c) прозерин и аминазин
- d) тромал

16. Основные признаки коматозного состояния:

- a) падение гемодинамики
- b) угнетение дыхания
- c) потеря мышечного тонуса
- d) угнетение центральной нервной системы (ЦНС)

17. Глубина комы определяется по степени угнетения:

- a) дыхания
- b) рефлексов
- c) гемодинамики
- d) сознания

18. Состояние глоточного рефлекса при коме 2 степени:

- a) сохранен
- b) снижен
- c) отсутствует
- d) усилен

19. ЛСД относится к:

- a) психостимуляторам
- b) производным конопли
- c) галлюциногенам
- d) опиатам

20. Для абстиненции при употреблении опиатов характерны все перечисленные симптомы, кроме:

- a) зуда в носу, чихания
- b) нарушения сна
- c) боли в суставах и мышцах
- d) сужения зрачков

21. Для абстиненции при употреблении препаратов конопли характерно все перечисленное, кроме:

- a) неприятных ощущений в сердце
- b) снижения настроения

- c) артериальной гипертензии
- d) тремора

22. К группе агонистов опиатных рецепторов не относятся:

- a) налоксон
- b) раствор из маковой соломки
- c) героин
- d) метадон

23. Кустарно изготовленный первитин относится к:

- a) опиатам
- b) психостимуляторам
- c) галлюциногенам
- d) транквилизаторам

24. Кокаин относится к:

- a) седативным средствам
- b) психостимуляторам
- c) галлюциногенам
- d) препаратам конопли

25. Метадон является:

- a) нейролептиком
- b) психостимулятором
- c) опиальным производным
- d) сильнодействующим веществом

26. Сужение зрачков характерно для:

- a) эфедроновой интоксикации
- b) опиального абстинентного синдрома
- c) гашишной интоксикации
- d) опиальной интоксикации

27. Для абстиненции при употреблении наркотиков стимулирующего ряда характерно все выше перечисленное, кроме:

- a) ощущения разбитости
- b) сонливости днем, бессонницы ночью
- c) психотических эпизодов
- d) ломящих болей в суставах и мышцах

28. Основными клиническими проявлениями алкогольной депрессии являются все перечисленное, кроме:

- a) снижения настроения
- b) чувства тоски и тревоги
- c) идей самообвинения и самоуничтожения
- d) бреда ревности

29. Для алкогольного бреда ревности характерно все выше перечисленное, кроме:

- a) бреда преследования
- b) идеи отношения
- c) тревоги
- d) тактильных галлюцинации

30. Основными признаками алкогольного галлюциноза являются:

- a) помрачение сознания
- b) полная амнезия психоза
- c) преобладание вербальных псевдогаллюцинаций
- d) преобладание истинных вербальных галлюцинаций

31. Судорожные припадки в абстинентном синдроме характерны для:

- a) опийной наркомании
- b) гашишной наркомании
- c) эфедроновой наркомании
- d) барбитуровой наркомании

32. Уголовная ответственность за изготовление, хранение и сбыт наркотиков предусмотрена статья УК РФ:

- a) 119
- b) 167
- c) 228
- d) 235

33. Характерными признаками при употреблении седативных препаратов являются все перечисленное, кроме:

- a) бледности кожных покровов
- b) зрительных галлюцинации
- c) снижения тонуса мышц и рефлексов
- d) смазанности речи

34. Для абстиненции при употреблении антипаркинсонических препаратов характерно все вышеперечисленное, кроме:

- a) снижения настроения
- b) тремора
- c) тактильных галлюцинаций
- d) делириозных расстройств

35. Результаты предрейсового медицинского осмотра заносятся в:

- a) журнал контроля трезвости
- b) протокол осмотра водителя автотранспортного средства
- c) путевой лист
- d) протокол медицинского освидетельствования для установления факта употребления алкоголя и состояния опьянения

36. Штамп в путевом листе водителей ставится при:

- a) допуске к работе
- b) наличии признаков употребления алкоголя
- c) наличии у водителей симптомов острого заболевания
- d) наличии признаков употребления наркотиков

37. Все листы журнала контроля трезвости должны быть:

- a) пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью организации и заверены подписью руководителя
- b) заверены только подписью медицинского работника, проводящего предрейсовый медицинский осмотр
- c) только пронумерованы
- d) заверены только подписью руководителя организации

38. При опьянении, вызванном употреблением наркотических или сильнодействующих веществ, выявляется все перечисленное, кроме:

- a) наличия следов инъекций
- b) акроцианоза, гипергидроза
- c) нистагма
- d) запаха алкоголя изо рта

39. Наркоманы, отказывающиеся от лечения:

- a) привлекаются к уголовной ответственности
- b) привлекаются к принудительному лечению
- c) к ответственности не привлекаются
- d) направляются на лечение в психиатрические больницы

40. О распространенности пьянства и алкоголизма наиболее эффективно свидетельствует следующий показатель:

- a) рождаемость
- b) смертность
- c) количество абсолютного алкоголя, потребляемого на душу населения в год
- d) количество состоящих на учете больных

41. Максимальное угнетение дыхательного центра после внутривенного введения морфина развивается через:

- a) 1 - 3 минуты
- b) 5 - 10 минут
- c) 15 - 20 минут
- d) 30 минут

42. Поражение периферической нервной системы при алкоголизме проявляется:

- a) полинейропатией
- b) рассеянным склерозом
- c) параличами
- d) парезами

43. Наркологическая помощь наркологическим больным оказывается по:

- a) просьбе больного
- b) просьбе и с согласия родителей или других законных представителей больного
- c) требованию общественных организаций по месту жительства больного
- d) требованию правоохранительных органов

44. Наименьшим угнетающим действием на дыхательный центр обладает:

- a) морфин
- b) омнолон
- c) промедол
- d) фентанил

45. Условно-рефлекторная терапия алкоголизма направлена на:

- a) выработку стойкого рефлекса отвращения к вкусу и запаху алкоголя
- b) повышение толерантности к алкоголю
- c) прерывание алкогольного эксцесса
- d) лечение абстиненции

46. Оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в Российской Федерации регламентируется:

- a) правилами внутреннего распорядка в ЛПУ
- b) Указами Президента Российской Федерации
- c) Федеральным законом Российской Федерации о наркотических средствах и психотропных веществах
- d) уголовным кодексом

47. С юридической точки зрения «производство» и «изготовление» наркотических средств – это:

- a) синонимы
- b) разные понятия
- c) оборот наркотических средств
- d) реализация наркотических средств

48. Под изготовлением наркотических средств подразумевается действия, направленные на:

- a) серийное получение наркотических средств
- b) получение готовых к использованию и потреблению наркотических средств
- c) культивирование растительного сырья для дальнейшего изготовления наркотических средств
- d) изготовление психотропных препаратов

49. Наиболее часто психозы развиваются при употреблении:

- a) препаратов конопли
- b) опиатов
- c) ингалянтов
- d) бензодиазепинов

50. Следы внутривенных инъекций обнаруживаются при употреблении:

- a) барбитуратов
- b) галлюциногенов
- c) стимуляторов
- d) антипаркинсонических препаратов

51. Максимальная толерантность к алкоголю развивается при алкоголизме:

- a) в первой стадии заболевания
- b) во второй стадии заболевания
- c) в третьей стадии заболевания
- d) в состоянии алкогольной абстиненции

52. Соматические изменения в III стадии алкоголизма:

- a) отсутствуют
- b) носят характер функциональных нарушений
- c) носят необратимый характер
- d) носят характер вегетативных расстройств

53. Ранним называется алкоголизм, формирующийся в период:

- a) до 25 лет
- b) до 18 лет
- c) внутриутробного развития
- d) 6 – 7 лет

54. Эфедрон чаще всего употребляется:

- a) внутривенно
- b) внутримышечно
- c) путем курения
- d) путем ингаляции

55. Алкогольная деградация личности проявляется:

- a) ослаблением памяти и утратой критики
- b) разноплановостью мышления
- c) морально-этическим снижением
- d) эмоциональной амбивалентностью

56. Для легкой степени алкогольного опьянения характерно:

- a) нарушение поведения
- b) нарушение сознания и ориентировки
- c) нарушение походки
- d) тремор

57. Осложненная наркомания – это сочетание зависимости от наркотиков и:

- a) антибиотиков
- b) алкоголя
- c) глюкокортикоидов
- d) витаминных препаратов

58. Социальные последствия наркологических заболеваний проявляются в:

- a) способности выполнять в полном объеме семейные и производственные обязанности
- b) выраженном профессиональном снижении с утратой прежней квалификации
- c) иждивенческих тенденциях
- d) деградации личности

59. Токсикомания – это заболевание, обусловленное употреблением:

- a) химических токсических веществ
- b) психотропных препаратов
- c) алкоголя
- d) наркотиков

60. Для интоксикации опиоидными наркотиками характерно:

- a) бледность кожи
- b) покраснение кожи
- c) сужение зрачков
- d) расширение зрачков

61. Алкоголь в организме в основном всасывается в:

- a) желудке
- b) двенадцатиперстной кишке
- c) толстом кишечнике
- d) тощей кишке

62. Основными признаками алкогольного параноида являются:

- a) галлюцинаторные расстройства
- b) чувственный аффект страха
- c) бред преследования
- d) психические автоматизмы

63. Эпилептиформный синдром при алкоголизме наиболее часто проявляется в виде:

- a) больших судорожных припадков
- b) эпилептического слабоумия
- c) дисфорических состояний
- d) сумеречного помрачения сознания

64. Основными признаками мусситирующего делирия являются:

- a) наличие истинных вербальных галлюцинаций
- b) преобладание простых двигательных актов
- c) бредовое поведение
- d) вербальная продукция в виде бормотания

65. Основными клиническими признаками «профессионального» делирия являются:

- a) бред преследования

- b) стереотипные автоматизированные действия
- c) слуховые галлюцинации
- d) ложные узнавания

66. Повторное медицинское освидетельствование проводится по:

- a) личному заявлению водителя
- b) направлению руководителя автотранспортного предприятия
- c) направлению медицинского работника
- d) направлению сотрудников ГИБДД

67. К метаболитам алкоголя относятся:

- a) ацетальдегид
- b) молочная кислота
- c) уксусная кислота
- d) масляная кислота

68. Для вынесения заключения о факте употребления наркотического вещества обязательным является:

- a) заявление испытуемого об употреблении наркотического вещества
- b) обнаружение наркотического вещества в биологических средах организма
- c) представление врачу сведений об употреблении испытуемым наркотического вещества
- d) выявление клиники опьянения (одурманивания), вызванного употреблением наркотических веществ

69. Для проведения лабораторных исследований биологических сред на содержание алкоголя используются:

- a) алкометры
- b) газовые хроматографы
- c) метод Раппопорта
- d) тест-полоски

70. Медицинские работники автотранспортных предприятий осуществляют:

- a) контроль за состоянием здоровья водителей
- b) анализ причин отстранения водителей от работы
- c) участие в служебном расследовании дорожно-транспортных происшествий (ДТП)
- d) проведение медицинских осмотров водителей

71. Переход от эпизодического к систематическому злоупотреблению алкоголем проявляется в:

- a) учащении периодов опьянения
- b) изменении характера опьянения
- c) традиционно обусловленных эпизодах употребления алкоголя
- d) росте толерантности к алкоголю

72. В неизменном виде алкоголь выводится из организма:

- a) печени
- b) легкими

- c) почками
- d) молочными железами

73. Начальный этап лечения алкоголизма предусматривает:

- a) выработку условного рефлекса отвращения к алкоголю
- b) прерывание злоупотребления алкоголем
- c) устранение абстинентного синдрома
- d) снижение признаков возбудимости

74. Для второй стадии алкоголизма наиболее характерны следующие признаки:

- a) физическая и психическая зависимость от алкоголя
- b) алкогольный абстинентный синдром
- c) высокая толерантность к алкоголю
- d) алкогольная деградация личности

75. Алкоголизм – это хроническое заболевание, характеризующееся:

- a) прогрессивным течением
- b) отсутствием патологического влечения к алкоголю
- c) формированием абстинентного синдрома
- d) развитием стойких соматических, неврологических расстройств и деградацией личности

76. Для наркомании характерно:

- a) развитие физической и психической зависимости от наркотиков
- b) рост толерантности к наркотическим веществам
- c) выраженные изменения личности
- d) отсутствие абстинентного синдрома

77. Клиническими проявлениями наркомании при употреблении препаратов стимулирующего ряда являются:

- a) приподнятое настроение
- b) повышение работоспособности
- c) болтливость
- d) острые бредовые состояния

78. Клиническими признаками кокаиновой наркомании являются:

- a) повышение интеллектуальной деятельности
- b) расширение зрачков, блеск глаз
- c) тактильные галлюцинации
- d) эпилептические припадки

79. Расширение зрачков характерно для:

- a) эфедроновой интоксикации
- b) барбитуровой интоксикации
- c) опийного абстинентного синдрома
- d) опийной интоксикации

- 80. Клиническими проявлениями наркомании при употреблении галлюциногенов являются:**
- a) зрительные галлюцинации
 - b) страх, подозрительность
 - c) бредовые идеи преследования
 - d) параличи нижних конечностей
- 81. Характерными признаками интоксикации при употреблении кетамина являются:**
- a) психомоторное возбуждение
 - b) зрительные и слуховые галлюцинации
 - c) нарушение речи
 - d) потеря способности запоминать текущие события
- 82. Симптомы интоксикации при употреблении препаратов антипаркинсонического действия:**
- a) эйфория
 - b) утрата реальности существования
 - c) сценopodobные галлюцинации
 - d) нарушение речи
- 83. Симптомы, характерные для употребления летучих органических соединений (бензин, толуол, бензол, ацетон и т.д.):**
- a) сужение зрачков
 - b) тахикардия
 - c) нарушение координации движений
 - d) дезориентировка
- 84. Основные симптомы Корсаковского психоза:**
- a) полиневриты
 - b) амнезия
 - c) конфабуляции
 - d) сохранность памяти
- 85. К синдромам помрачения сознания могут быть отнесены следующие:**
- a) оглушение
 - b) делирий
 - c) онейроид
 - d) психоорганический синдром
- 86. Основными задачами предрейсовых медицинских осмотров являются выявление у водителей:**
- a) признаков употребления алкоголя
 - b) признаков употребления наркотических средств
 - c) наличие у водителей симптомов острого заболевания или обострения хронического заболевания
 - d) признаков употребления сильнодействующих веществ

87. Предрейсовые медицинские осмотры проводятся:

- a) врачами
- b) фельдшерами
- c) медицинскими сестрами
- d) работниками автотранспортных предприятий

88. В кабинеты экспертизы опьянения после проведения предрейсового медицинского осмотра водителя направляются в случаях:

- a) противоречивости данных клинического и лабораторного исследования
- b) согласия водителя с заключением проведенного контроля трезвости
- c) неясной или неполной клинической картины опьянения
- d) сомнительных результатов лабораторного исследования

89. В «группу риска» входят водители:

- a) склонные к употреблению психоактивных веществ
- b) длительно и часто болеющие
- c) старше 40 лет
- d) старше 55 лет

90. Для водителей «группы риска» проводятся медицинские осмотры:

- a) предрейсовые
- b) текущие
- c) послерейсовые
- d) еженедельные

91. К обороту наркотических средств относятся:

- a) культивирование растений, содержащих наркотические вещества естественного происхождения
- b) производство и изготовление наркотических средств
- c) хранение, перевозка и пересылка наркотических средств
- d) пропаганда употребления наркотиков

92. К основным принципам антиалкогольной терапии относятся:

- a) непрерывность и длительность
- b) комплексность
- c) максимальная индивидуальность
- d) принудительность

93. Клинические проявления алкогольного абстинентного синдрома:

- a) тремор, потливость
- b) влечение к опохмелению
- c) сухость кожи
- d) повышение аппетита

94. Наркомания - это заболевание, вызванное употреблением:

- a) опиатов

- b) препаратов конопли
- c) препаратов стимулирующего действия
- d) сильнодействующих препаратов

95. К клиническим проявлениям наркомании при употреблении препаратов конопли относят:

- a) ощущение легкости движений
- b) психомоторное возбуждение
- c) расстройство сознания, бред, галлюцинации
- d) благодушие, расслабленность

96. Основными симптомами алкогольного делирия являются:

- a) аффективные расстройства
- b) зрительные и слуховые галлюцинации
- c) бред преследования
- d) зрительные и слуховые псевдогаллюцинации

97. Основные симптомы энцефалопатии Гайе-Вернике:

- a) нарушение сознания
- b) психотические расстройства
- c) гиперкинезы
- d) отсутствие неврологических расстройств

98. При химико-токсикологических исследованиях для определения наркотических или сильнодействующих веществ в биологических средах организма используют:

- a) тест-полоски
- b) газожидкостную и тонкослойную хроматографию
- c) иммуноферментный анализ
- d) алкометры

99. Помещение для проведения предрейсовых медицинских осмотров должно иметь:

- a) мебель (кушетка медицинская, письменный стол, стол и т.д.)
- b) электрокардиограф
- c) приборы для определения алкоголя в биологических средах организма
- d) тест-полоски

100. Гарантированный объем помощи больным наркоманией включает:

- a) обследование
- b) диагностику
- c) стационарное лечение
- d) санаторное лечение

101. Перечислите, что нужно сделать при аварийной ситуации в случае обслуживания ВИЧ-инфицированного:

- a) поставить в известность заведующую отделением или вышестоящего по должности мед. работника;
- b) обратиться к доверенному по ВИЧ – инфекции врачу ЛПУ;
- c) выполнить генеральную уборку по эпид. показаниям;
- d) зарегистрировать в журнале аварийную ситуацию;
- e) провести химиопрофилактику АЗТ (азидотимидин) в течение 1 месяца;
- f) провести химиопрофилактику АЗТ (азидотимидин) в течение 2-х месяцев;
- g) составит акт о несчастном случае на производстве;
- h) оказать себе самопомощь и организовать дезинфекцию;
- i) сообщить о ситуации родственникам больного;
- j) мед. работнику пройти обследование на наличие антител к ВИЧ.

102. К какой группе вирусов относится ВИЧ?

- a) семейство ортовирюсов, подсемейство лентивирусов;
- b) семейство ретровирусов, подсемейство лентивирусов;
- c) семейство арбовирусов, подсемейство флавовирусов;
- d) семейство ретровирусов, подсемейство линсивирусов.

103. Наиболее ранний срок появления антител к ВИЧ после заражения составляет:

- a) 2 недели;
- b) 1 месяц;
- c) 3 месяца.

104. Для установления инфицированности ВИЧ у взрослого достаточно:

- a) обнаружения в крови специфических антител к ВИЧ методом ИБ;
- b) определение уровня СД 4;
- c) наличие персистирующей генерализованной лимфоденопатии;
- d) наличие контакта с ВИЧ – инфицированным;
- e) наличие саркомы Капоши с сочетанием генерализованной лимфоденопатии

105. Пробы сыворотки, до момента доставки в лабораторию, могут храниться в ЛПУ:

- a) до 1 суток при температуре +4 +8 градусов С;
- b) в течение 5 суток при температуре +4 +8 градусов С;
- c) до 7 суток при температуре +4 +8 градусов С;
- d) несколько месяцев при температуре +4 +8 градусов С.

106. Какие методы используются для выявления антител к ВИЧ в исследуемой сыворотке пациента?

- a) полимеразная цепная реакция (ПЦР);
- b) иммуноферментный анализ (ИФА);
- c) проточная цитометрия.

107. Ребенок от ВИЧ – инфицированной матери может заразиться:

- a) внутриутробно;

- b) в родах;
- c) при бытовом уходе за ребенком (пеленание, купание и т.д.);
- d) при грудном вскармливании;
- e) при наличии ВИЧ – инфекции у акушерки.

108. Назовите отличия в обслуживании заведомо ВИЧ – инфицированного пациента при проведении парентеральной процедуры:

- a) одеть маску, перчатки, халат, очки;
- b) одеть двойные латексные перчатки;
- c) одеть бахилы, сменную обувь;
- d) приготовить емкости с дез.раствором;
- e) обработать руки для проведения хирургических вмешательств;
- f) обработать фаланги спиртовым раствором йода;
- g) обработать и заклеить ранки на руках;
- h) выполнять процедуру в присутствии старшей сестры или заведующей отделением;
- i) иметь дублера на случай аварийной ситуации.

109. Действия медработника в случае попадания крови на слизистую носа:

- a) промыть 50% раствором марганцевого кислого калия;
- b) закапать 96% спирт;
- c) промыть большим количеством воды.