

**ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
«РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ»
Вторая категория**

- 1. Какая акупунктурная точка располагается на лучевом крае лучевой кости, в углублении выше шиловидного отростка, на 1,5 цуня проксимальнее лучезапястного сустава?**
 - a) 1I чжун-фу
 - b) 5I чи-цзэ
 - c) 7I ле-цюе
 - d) 8I цзин-цюй

- 2. Какая акупунктурная точка располагается в подключичной ямке, на 6 цуней кнаружи от передней срединной линии, на уровне I межреберья?**
 - a) 1I чжун-фу
 - b) 5I чи-цзэ
 - c) 7I ле-цюе
 - d) 8I цзин-цюй

- 3. Какая акупунктурная точка располагается во впадине между акромиальным отростком лопатки и большим бугром плечевой кости?**
 - a) 10II шоу-сань-ли
 - b) 11II цюй-чи
 - c) 15II цзянь-юй
 - d) 16II цзюй-гу

- 4. Какая акупунктурная точка располагается в носогубной складке, на 0,5 цуня кнаружи от центра крыла носа?**
 - a) 20II ин-сян
 - b) 1III чэн-ци
 - c) 2III сы-бай
 - d) 3III цзюй-ляо

- 5. Какая акупунктурная точка располагается под зрачком на середине нижнего края орбиты?**
 - a) 20II ин-сян
 - b) 1III чэн-ци
 - c) 2III сы-бай
 - d) 3III цзюй-ляо

- 6. Какая акупунктурная точка располагается на тыле стопы, во впадине между сухожилиями длинного разгибателя большого пальца и длинного разгибателя пальцев?**
 - a) 36III цзу-сань-ли
 - b) 40III фэн-лун
 - c) 41III цзе-си

- d) 42III чун-ян
- 7. Какая акупунктурная точка располагается во впадине, на конце поперечной кожной складке лучезапястного сустава, у лучевого края лучевой артерии?**
- a) 5I чи-цзэ
 - b) 7I ле-цюе
 - c) 8I цзин-цюй
 - d) 9I тай-юань
- 8. Какая акупунктурная точка располагается у середины I пястной кости, на границе тыльной и ладонной поверхности кожи?**
- a) 8I цзин-цюй
 - b) 9I тай-юань
 - c) 10I юй-цзи
 - d) 11I шао-шан
- 9. Какая акупунктурная точка располагается на уровне шиловидного отростка лучевой кости, на 1 цунь выше точки 9I?**
- a) 5I чи-цзэ
 - b) 7I ле-цюе
 - c) 8I цзин-цюй
 - d) 10I юй-цзи
- 10. Какая акупунктурная точка располагается на лучевом крае запястья, между сухожилиями короткого и длинного разгибателей большого пальца?**
- a) 3II сань-цзянь
 - b) 4II хэ-гу
 - c) 5II ян-си
 - d) 6II пянь-ли
- 11. Какая акупунктурная точка располагается на дистальной фаланге II пальца кисти, примерно на 3 мм в лучевую сторону от корня ногтя?**
- a) 11I шао-шан
 - b) 1II шан-ян
 - c) 9IX чжун-чун
 - d) 9V шао-чун
- 12. Какая акупунктурная точка располагается во впадине кпереди от II и III плюснефаланговых суставов?**
- a) 42III чун-ян
 - b) 43III сянь-гу
 - c) 44III нэй-тин
 - d) 45III ли-дуй
- 13. Какая акупунктурная точка располагается на тыле кисти, в углу, образованном проксимальными концами I и II пястных костей?**
- a) 4II хэ-гу

- b) 6II пянь-ли
- c) 11II цюй-чи
- d) 20II ин-сян

14. Какая акупунктурная точка располагается кнаружи от угла рта на 1 см?

- a) 20II ин-сян
- b) 4III ди-цан
- c) 1III чэн-ци
- d) 2III сы-бай

15. Какая акупунктурная точка располагается в сторону от пупка на 2 цуня?

- a) 25III тянь-шу
- b) 4IV фу-цзе
- c) 16IV фу-ай
- d) 35III ду-би

16. Какая акупунктурная точка располагается ниже верхнего края латерального мыщелка большеберцовой кости на 3 цуня, у наружного края передней большеберцовой мышцы?

- a) 36III цзу-сань-ли
- b) 40III фэн-лун
- c) 41III цзе-си
- d) 42III чун-ян

17. Какая акупунктурная точка располагается выше центра латеральной лодыжки на 8 цуней, у наружного края брюшка передней большеберцовой мышцы, на уровне точки 38III тьяо-коу, кзади от нее на 1 цунь?

- a) 36III цзу-сань-ли
- b) 40III фэн-лун
- c) 41III цзе-си
- d) 42III чун-ян

18. Какая акупунктурная точка располагается на тыле стопы, между суставами II-III клиновидных и II-III плюсневых костей, на самой возвышенной части стопы?

- a) 42III чун-ян
- b) 43III сянь-гу
- c) 44III нэй-тин
- d) 45III ли-дуй

19. Какая акупунктурная точка располагается в межкостной щели между II и III плюсневыми костями, кзади от плюснефалангового сустава?

- a) 42III чун-ян
- b) 43III сянь-гу
- c) 44III нэй-тин
- d) 45III ли-дуй

- 20. Какая акупунктурная точка располагается на 3 мм от наружного края корня ногтя II пальца стопы?**
- a) 42III чун-ян
 - b) 43III сянь-гу
 - c) 44III нэй-тин
 - d) 45III ли-дуй
- 21. Какая акупунктурная точка располагается во впадине кнутри от ключично-лопаточного сочленения?**
- a) 10II шоу-сань-ли
 - b) 11II цюй-чи
 - c) 15II цзянь-юй
 - d) 16II цзюй-гу
- 22. Какая акупунктурная точка располагается на середине расстрояния между латеральным надмышцелком и лучевым краем складок локтевого сгиба?**
- a) 10II шоу-сань-ли
 - b) 11II цюй-чи
 - c) 15II цзянь-юй
 - d) 16II цзюй-гу
- 23. Какая акупунктурная точка располагается ниже 11II цюй-чи на 2 цуня, у лучевого края лучевой кости?**
- a) 10II шоу-сань-ли
 - b) 11II цюй-чи
 - c) 15II цзянь-юй
 - d) 16II цзюй-гу
- 24. Какая акупунктурная точка располагается у верхнего края большеберцовой кости, во впадине кнаружи от колено-чашечной связки, на уровне нижнего края коленной чашечки?**
- a) 25III тянь-шу
 - b) 14IV фу-цзе
 - c) 16IV фу-ай
 - d) 35III ду-би
- 25. Какая акупунктурная точка располагается на третьей боковой линии живота, ниже точки 15IV да-хэн на 1,3 цуня?**
- a) 25III тянь-шу
 - b) 14IV фу-цзе
 - c) 16IV фу-ай
 - d) 35III ду-би
- 26. Какая акупунктурная точка располагается на третьей боковой линии живота, выше точки 15IV да-хэн на 3 цуня?**
- a) 25III тянь-шу
 - b) 14IV фу-цзе

- c) 16IV фу-ай
- d) 35III ду-би

27. Какая акупунктурная точка располагается в центре подколенной ямки?

- a) 34VII ся-ляо
- b) 40VII вэй-чжун
- c) 58VII фэй-ян
- d) 60 VII кунь-лунь

28. Какая акупунктурная точка соответствует третьему заднему крестцовому отверстию?

- a) 34VII ся-ляо
- b) 40VII вэй-чжун
- c) 58VII фэй-ян
- d) 60 VII кунь-лунь

29. Какая акупунктурная точка располагается выше центра латеральной лодыжки на 7 цуней?

- a) 34VII ся-ляо
- b) 40VII вэй-чжун
- c) 58VII фэй-ян
- d) 60 VII кунь-лунь

30. Какая акупунктурная точка располагается посередине между ахилловым сухожилием и латеральной лодыжкой?

- a) 34VII ся-ляо
- b) 40VII вэй-чжун
- c) 58VII фэй-ян
- d) 60 VII кунь-лунь

31. Какой клинический признак свидетельствует о синдроме ЯН?

- a) лицо бледное с землистым оттенком
- b) жидкий стул
- c) поверхностный пульс
- d) сонливость

32. Какой клинический признак свидетельствует о синдроме ЯН?

- a) пониженная температура тела
- b) распирающие боли в желудке после приема пищи
- c) плохая переносимость холода
- d) потливость на фоне слабости

33. Какой клинический признак свидетельствует о синдроме ЯН?

- a) гиперрефлексия
- b) лицо бледное с землистым оттенком
- c) жидкий стул

d) сонливость

34. Какой клинический признак свидетельствует о синдроме ЯН?

- a) физическая выносливость
- b) отсутствие аппетита
- c) утомляемость
- d) сонливость

35. Какой клинический признак свидетельствует о синдроме ЯН?

- a) гипоменорея
- b) лицо бледное с землистым оттенком
- c) жидкий стул
- d) гиперменорея

36. В течение какого времени при измерении электропроводности в тесте Накатани активный электрод соприкасается с кожными покровами в области репрезентативной точки?

- a) 2-3 сек
- b) 4-6 сек
- c) 8-10 сек
- d) 50-60 сек

37. Какие акупунктурные точки используются для проведения теста Накатани в качестве репрезентативных на ножных меридианах?

- a) 4IV, 2XII, 2VIII, 41XI, 43III, 64VII
- b) 3IV, 3XII, 3VIII, 40XI, 42III, 65VII
- c) 2IV, 4XII, 1VIII, 43XI, 44III, 67VII
- d) 5IV, 1XII, 6VIII, 44XI, 45III, 62VII

38. Какие акупунктурные точки используются для проведения теста Накатани в качестве репрезентативных на ручных меридианах?

- a) 9I, 7IX, 7V, 5VI, 4X, 5II
- b) 10I, 8IX, 8V, 3VI, 3X, 3II
- c) 8I, 6IX, 5V, 7VI, 5X, 6II
- d) 7I, 5IX, 4V, 8VI, 8X, 10II

39. Пальпаторное исследование какой точки следует предпринять для диагностики поражения меридиана сердца?

- a) 3XIV
- b) 25XI
- c) 1IX
- d) 14XIV

40. Какое время учитываются при проведении теста АКАБАНЕ?

- a) от начала прогревания точки до появления чувства жжения, укола
- b) от начала прогревания точки до появления непереносимой боли
- c) от начала прогревания точки до покраснения кожи

d) от начала прогревания точки до развития ожога

41. Пальпаторное исследование какой точки следует предпринять для диагностики поражения меридиана перикарда?

- a) 3XIV
- b) 25XI
- c) 1IX
- d) 5XIV

42. Пальпаторное исследование какой точки следует предпринять для диагностики поражения меридиана тонкого кишечника?

- a) 23VII
- b) 25VII
- c) 27VII
- d) 28VII

43. Какова ширина физиологического коридора на карте Риодораку в миллиметрах?

- a) 10
- b) 14
- c) 20
- d) 28

44. Какие значения электропроводности в репрезентативных точках используют для построения "физиологического коридора" на карте Риодораку?

- a) наибольшие величины
- b) средние величины
- c) наименьшие величины
- d) случайные величины

45. Какой клинический признак свидетельствует о синдроме ИНЬ?

- a) эмоции резкие, подвижные
- b) повышенный тонус мышц
- c) поверхностный пульс
- d) глухой кашель

46. Какой клинический признак свидетельствует о синдроме ИАНЬ?

- a) эмоции слабые, торпидные
- b) блестящие глаза
- c) поверхностный пульс
- d) звонкий кашель

47. Какой клинический признак свидетельствует о синдроме ИЯНЬ?

- a) высокая температура
- b) поведение активное
- c) запор
- d) сонливость

48. Какой клинический признак свидетельствует о синдроме ИНЬ?

- a) судороги
- b) цвет языка красный
- c) цианоз губ
- d) потливость днем

49. Какой клинический признак свидетельствует о синдроме ИНЬ?

- a) эмоции резкие, подвижные
- b) повышенный тонус мышц
- c) поверхностный пульс
- d) гипоменорея

50. У ослабленных больных обычно рекомендуется использовать

- a) первый вариант раздражающего воздействия
- b) второй вариант раздражающего воздействия
- c) третий вариант раздражающего воздействия
- d) дисперсию

51. Пальпаторное исследование какой точки следует предпринять для диагностики поражения меридиана легких?

- a) 3XIV
- b) 25XI
- c) 1I
- d) 5XIV

52. Какой клинический признак свидетельствует о синдроме избыточности меридиана легких?

- a) звонкий кашель
- b) хриплый кашель
- c) холодный пот
- d) головокружение

53. Какой клинический признак свидетельствует о синдроме избыточности меридиана желудка?

- a) отсутствие аппетита
- b) чувство голода
- c) частая зевота
- d) чувство переполнения в желудке

54. Какой клинический признак свидетельствует о синдроме избыточности меридиана сердца?

- a) чувство печали
- b) бледное лицо
- c) боли в области сердца
- d) головокружение

- 55. Какой клинический признак свидетельствует о синдроме избыточности меридиана почек?**
- a) задержка мочи
 - b) недержание мочи
 - c) обильное потоотделение
 - d) ощущение холода в ногах
- 56. Какой клинический признак свидетельствует о синдроме недостаточности меридиана толстой кишки?**
- a) запор
 - b) озноб
 - c) вздутие живота
 - d) понос
- 57. Какой клинический признак свидетельствует о синдроме недостаточности меридиана селезенки?**
- a) боли в суставах ног
 - b) рвота
 - c) вздутие живота
 - d) тошнота, отрыжка
- 58. Какой клинический признак свидетельствует о синдроме недостаточности меридиана тонкой кишки?**
- a) звон в ушах
 - b) запор
 - c) головная боль
 - d) боли в области пупка
- 59. Какой клинический признак свидетельствует о синдроме недостаточности меридиана перикарда?**
- a) чувство гневливости
 - b) депрессивное состояние
 - c) запор
 - d) покраснение глаз
- 60. Какой клинический признак свидетельствует о синдроме недостаточности меридиана печени?**
- a) головокружение
 - b) нарушение сна
 - c) головная боль
 - d) желтушность кожи
- 61. Повреждение артерии во время иглоукалывания возможно при воздействии на точку:**
- a) 1VII
 - b) 16XIII
 - c) 40VII

d) 8VI

62. Повреждение артерии во время иглокалывания возможно при воздействии на точку:

- a) 11XII
- b) 1III
- c) 16XIII
- d) 34XI

63. Глубокое введение акупунктурных игл не применяют для точек

- a) в области шеи
- b) в поясничной области
- c) на голени
- d) в области ягодиц

64. Укол под острым углом обычно применяют при локализации аурикулярных точек в проекции:

- a) протикозелка
- b) мочки уха
- c) полости раковины
- d) чаши раковины

65. Вертикальный укол обычно применяют при локализации аурикулярных точек в проекции:

- a) верхней ножки противозавитка
- b) ладьевидной ямки
- c) мочки уха
- d) нижней ножки противозавитка

66. Выберите показания для применения электроакупунктуры:

- a) гипертонический криз
- b) приступ стенокардии
- c) эпилептический припадок
- d) острый вертеброгенный болевой синдром

67. Показанием к применению лазеропунктуры является:

- a) хронический тонзиллит
- b) ночное недержание мочи
- c) послеоперационное обезболивание
- d) гипертонический криз

68. Показанием к применению лазеропунктуры является:

- a) миопия у детей
- b) почечная колика
- c) невралгия лучевого нерва
- d) приступ удушья при бронхиальной астме

69. Методы лазерной рефлексотерапии абсолютно противопоказаны больным

- a) с невропатиями
- b) с миофасциальными болевыми синдромами
- c) с язвенной болезнью желудка
- d) с геморрагическими синдромами

70. Методы лазерной рефлексотерапии абсолютно противопоказаны больным

- a) с цереброваскулярными заболеваниями
- b) с новообразованиями
- c) с ишемической болезнью сердца
- d) с бронхиальной астмой

71. Поражение какого органа возможно при нарушении правил техники безопасности для работы с лазерными установками?

- a) печень
- b) головной мозг
- c) глаза
- d) сердце

72. Показанием к применению краниопунктуры является

- a) афазия после острого нарушения мозгового кровообращения
- b) стенокардия
- c) хронический гастрит
- d) хронический пиелонефрит

73. Показанием к применению краниопунктуры является:

- a) эпилепсия
- b) гипертоническая болезнь
- c) центральный паралич после острого нарушения мозгового кровообращения
- d) пароксизмальная тахикардия

74. При расстройствах речи центрального генеза краниопунктуру у левшей следует проводить

- a) слева
- b) справа
- c) с двух сторон
- d) сторона укола не имеет значения

75. Показания к использованию первой пары чудесных меридианов?

- a) неврологические проявления остеохондрозов
- b) кожный зуд
- c) хронический бронхит
- d) стенокардия

76. Показания к использованию второй пары чудесных меридианов?

- a) неврологические проявления остеохондрозов

- b) хроническая пневмония
- c) хронический бронхит
- d) ПНМК

77. Показания к использованию третьей пары чудесных меридианов?

- a) неврологические проявления остеохондрозов
- b) кожный зуд
- c) хронический бронхит
- d) стенокардия

78. Показания к использованию первой пары чудесных меридианов?

- a) неврологические проявления остеохондрозов
- b) функциональные гиперкинезы
- c) бронхиальная астма
- d) стенокардия

79. Точками ключами для первой пары чудесных меридианов являются?

- a) 5X, 41XI
- b) 3VI, 62VII
- c) 6VIII, 7I
- d) 6IX, 4IV

80. Точками ключами для четвертой пары чудесных меридианов являются?

- a) 5X, 41XI
- b) 3VI, 62VII
- c) 6VIII, 7I
- d) 6IX, 4IV

81. Точкой группового ло для второй пары чудесных меридианов являются?

- a) 8X
- b) 39XI
- c) 5IX
- d) 6IV

82. Точкой группового ло для третьей пары чудесных меридианов являются?

- a) 8X
- b) 39XI
- c) 5IX
- d) 6IV

83. Точкой соединения для первой пары чудесных меридианов являются?

- a) 8III
- b) 2III
- c) 3XIV
- d) 22XI

84. Точкой соединения для четвертой пары чудесных меридианов являются?

- a) 8III
- b) 2III
- c) 3XIV
- d) 22XI

85. Первый вид связей между меридианами осуществляется

- a) за счет ло-пунктов
- b) на кончиках пальцев в тинговых точках, между иньскими и янскими меридианами
- c) посредством чудесных меридианов
- d) между янскими ручными и ножными меридианами на голове

86. Четвертый вид связей между меридианами осуществляется

- a) за счет ло-пунктов
- b) на кончиках пальцев в тинговых точках, между иньскими и янскими меридианами
- c) посредством чудесных меридианов
- d) между янскими ручными и ножными меридианами на голове

87. Какие точки являются специфическими точками для лечения периферических нервов?

- a) 60 VII
- b) 3VI, 4II
- c) 3V, 8IX
- d) 10VII, 12XIV

88. Какие точки являются специфическими точками для лечения ваготонии?

- a) 60 VII
- b) 3VI, 4II
- c) 3V, 8IX
- d) 10VII, 12XIV

89. Какие точки являются специфическими точками для лечения психической депрессии?

- a) 60 VII
- b) 3VI, 4II
- c) 3V, 8IX
- d) 10VII, 12XIV

90. Какие точки являются специфическими точками для лечения верхней конечности?

- a) 60 VII
- b) 3VI, 4II
- c) 3V, 8IX
- d) 10VII, 12XIV

- 91. Какие точки являются специфическими точками для лечения половых расстройств?**
- a) 26XI, 4XIV
 - b) 10VII, 12XIV
 - c) 3V, 8IX
 - d) 39XI
- 92. Какие точки являются специфическими точками для лечения заболеваний спинного мозга?**
- a) 26XI, 4XIV
 - b) 10VII, 12XIV
 - c) 3V, 8IX
 - d) 39XI
- 93. Какая точка более эффективна при лечении болей по ходу меридиана легких?**
- a) 6I
 - b) 10I
 - c) 1I
 - d) 11I
- 94. Какая точка более эффективна при лечении болей по ходу меридиана мочевого пузыря?**
- a) 6VII
 - b) 15VII
 - c) 59VII
 - d) 36VII
- 95. Абсолютным противопоказанием для проведения рефлексотерапии является?**
- a) новообразования
 - b) вертеброгенные синдромы
 - c) бронхиальная астма
 - d) полиневропатия
- 96. Какое максимальное количество игл можно использовать для лечения детей до 1 года?**
- a) 4-5
 - b) 3
 - c) 10-11
 - d) 8-9
- 97. Какое максимальное количество игл можно использовать для лечения детей в возрасте 3-5 лет?**
- a) 4-5
 - b) 3
 - c) 10-11
 - d) 8-9

- 98. Какое максимальное время экспозиции игл при лечении детей в возрасте 1-3 лет?**
- a) 30 секунд
 - b) 6 минут
 - c) 20 минут
 - d) 3-4 минуты
- 99. Какое максимальное время экспозиции игл при лечении детей в возрасте 5-7 лет?**
- a) 10 минут
 - b) 6 минут
 - c) 20 минут
 - d) 3-4 минуты
- 100. Какова глубина введения игл при лечении детей в возрасте до 1 года?**
- a) 1 мм
 - b) 3-5 мм
 - c) 0,5 мм
 - d) каноническая
- 101. При каких процедурах возможно заражение пациента:**
- a) Переливание крови и ее компонентов;
 - b) Трансплантация органов и тканей;
 - c) в/м инъекция одноразовым шприцем;
 - d) физиотерапевтические процедуры;
 - e) любая парентеральная процедура, при которой произошел несчастный случай с повреждением кожи или слизистой;
 - f) фиброгастроскопия;
 - g) визуальный осмотр.
- 102. Действие медработника в случае попадания крови на слизистую глаза:**
- a) Обработать 20% раствором сульфацила;
 - b) Промыть большим количеством воды.
- 103. Анонимное обследование на ВИЧ – инфекцию проводится в следующих случаях:**
- a) По желанию пациента;
 - b) При отсутствии у пациента документов удостоверяющих личность;
 - c) При обследовании пациента при получении сертификата об отсутствии ВИЧ - инфекции.
- 104. Причинами ложноотрицательных результатов на ВИЧ-инфекцию являются:**
- a) Обследование пациента в период «серонегативного окна»
 - b) Несвоевременная доставка пробы биоматериала в лабораторию;
 - c) Наличие у пациента туберкулеза, сифилиса;
 - d) Инфицированность пациента вирусными гепатитами
- 105. Риск заражения ВИЧ-инфекцией при переливании инфицированной крови:**

- a) Приближается к 100%;
- b) 30-50%;
- c) Отсутствует;
- d) 3-5%.

106. Вы узнали о диагнозе ВИЧ-инфекция у вашего пациента ваши действия:

- a) Сообщите своим коллегам о диагнозе;
- b) Примете все меры предосторожности при обслуживании вами больного;
- c) Сделаете отметку в истории болезни или амбулаторной карте о данном диагнозе;
- d) Прежде, чем обслуживать больного, сообщите о нем в администрацию ЛПУ, получите разрешение на его обслуживание.

107. Подлежат ли обследованию на антитела к ВИЧ лица с инфекциями, обусловленными вирусом простого герпеса:

- a) генитальный герпес;
- b) с хроническими, рецидивирующими формами заболевания;
- c) с острой локализованной формой;
- d) не подлежат.

108. Выберите, где есть риск заражения ВИЧ-инфекцией:

- a) Повторном использовании одноразового гинекологического зеркала без стерилизации;
- b) Однократном использовании одноразового шприца и иглы;
- c) Повторном использовании одноразового шприца нескольким пациентам, меняя только инъекционные иглы;
- d) При проведении бронхоскопии, ФГС.

109. Действие медработника в случае попадания крови в рот:

- a) Прополоскать большим количеством воды, затем прополоскать 70* спиртом;
- b) Прополоскать 70*спиртом;
- c) Прополоскать 0,05% раствором перманганата калия.

110. Подлежат ли обследованию на ВИЧ- лица с:

- a) Глубокими микозами;
- b) Дизентерией;
- c) Рецидивирующим опоясывающим лишаем у лиц моложе 60 лет;
- d) Нейродермитом;
- e) Гриппом;
- f) Анемией.

111. Кто имеет право подписывать информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство или отказ от медицинского вмешательства?

- a) гражданин, нуждающийся в медицинской помощи;
- b) один из родителей;
- c) законный представитель гражданина;
- d) медицинский работник;
- e) все вышеперечисленные.

112. Какие виды экспертиз проводятся в соответствии с ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан РФ» от 21.11.2011г. №323-ФЗ?

- a) экспертиза временной нетрудоспособности;
- b) экспертиза качества медицинской помощи;
- c) военно-врачебная экспертиза;
- d) медико-социальная экспертиза;
- e) экспертиза профессиональной пригодности;
- f) экспертиза связи заболевания с профессией;
- g) судебно-медицинская;
- h) судебно-психиатрическая экспертиза;
- i) все вышеперечисленные.

113. На какой срок может выдать листок нетрудоспособности врач единолично?

- a) на срок не более 15 дней;
- b) на срок не более 30 дней;
- c) на весь срок нетрудоспособности.

114. Какие формы контроля качества и безопасности медицинской деятельности определены в ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ от 21.11.2011г. № 323-ФЗ?

- a) государственный контроль;
- b) ведомственный контроль;
- c) внутренний контроль;
- d) все вышеперечисленные.

115. Как часто может гражданин выбирать медицинскую организацию для получения первичной медико-санитарной помощи, в том числе по территориально-участковому принципу?

- a) не чаще чем два раза в год;
- b) не чаще чем один раз в год;
- c) не чаще одного раза в 2 года.

116. Кто имеет право непосредственно знакомиться с медицинской документацией пациента, отражающей состояние его здоровья?

- a) пациент и его законный представитель;
- b) родственники;
- c) работодатели.

117. Каким Приказом в настоящее время утвержден порядок выдачи листков нетрудоспособности?

- a) приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.06.2011г. №624н «Об утверждении порядка выдачи листков нетрудоспособности»;
- b) приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.08.2007г. №514 «О порядке выдачи медицинскими организациями листков нетрудоспособности»;
- c) приказом ФСС РФ №18, Минздрава РФ №29 от 29.01.2004г. «Об утверждении Инструкции о порядке обеспечения бланками листков нетрудоспособности, их учета и хранения».

118. Каким Приказом в настоящее время утверждена форма бланка листка нетрудоспособности?

- a) приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.06.2011г. №624н «Об утверждении порядка выдачи листков нетрудоспособности»;
- b) приказом Минздравсоцразвития от 26.04.2011г. №347н «Об утверждении формы бланка листка нетрудоспособности»;
- c) приказом ФСС РФ №18, Минздрава РФ №29 от 29.01.2004г. «Об утверждении Инструкции о порядке обеспечения бланками листков нетрудоспособности, их учета и хранения».

119. Каким приказом утверждена Инструкция о порядке обеспечения бланками листков нетрудоспособности, их учета и хранения?

- a) приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.06.2011г. №624н «Об утверждении порядка выдачи листков нетрудоспособности»;
- b) приказом Минздравсоцразвития от 26.04.2011г. №347н «Об утверждении формы бланка листка нетрудоспособности»;
- c) приказом ФСС РФ №18, Минздрава РФ №29 от 29.01.2004г. «Об утверждении Инструкции о порядке обеспечения бланками листков нетрудоспособности, их учета и хранения».

120. Укажите основные принципы охраны здоровья граждан в Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

- a) соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий;
- b) приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи;
- c) приоритет охраны здоровья детей;
- d) социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья;
- e) ответственность органов государственной власти и органов местного самоуправления, должностных лиц организаций за обеспечение прав граждан в сфере охраны здоровья;
- f) доступность и качество медицинской помощи;
- g) недопустимость отказа в оказании медицинской помощи;
- h) приоритет профилактики в сфере охраны здоровья;
- i) соблюдение врачебной тайны;
- j) всё вышеперечисленное.